

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ○ Réclamation | : contact@mupras.com |
| ○ Prise en charge | : pec@mupras.com |
| ○ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule :

00953

Société :

RAM.

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

BAKKAL

Mohammed.

Date de naissance :

16/01/1965

Adresse :

SAF EL HANA Rue 22 N°21 CASA.

Tél. :

05 22 396576

Total des frais engagés : _____ Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Centre Hemodialyse privé IBN ROCHD
Docteur Mohamed AJOURY
NEPHROLOGUE
Rue Abou Bakr Mohamed Ibn Zouhaïr
Casablanca 022.99.28.01

Date de consultation :

29/08/2009

Nom et prénom du malade :

Mauguer ZAHRA

Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

PCT

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 09/08/2009

Signature de l'adhérent(e) :

ABDALLAH
MUPRAS

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29/03/2019	C	C	62,	INP : 09/03/2019 Dr. Jeanne Privé IBN RACHED à Zouhair Chamet AUBUBY LOGIC MED Zouhair Assefia 21/03/87 89

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>ARMERIA HAYEK KARIM El AAKOUCZ KARIM 32 Rue Massau - Casablanca 05 22 30 35 22</i>	29 - 3 19	31.07.22 T = 1366,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

AUXILIAIRES MEDICAUX						Montant détaillé des Honoraires	
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre					
		A M	P C	I M	I V		



VOLET ADHERENT

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODP.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	$ \begin{array}{r} \text{H} & 25533412 & 21433552 \\ \text{D} & 00000000 & 00000000 \\ & \hline & 00000000 & 00000000 \\ & 35533411 & 11433553 \end{array} $ G			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Mohamed AJOUBY

NEPHROLOGUE

Spécialiste des Maladies du Rein

& Voies Urinaires

HEMODIALYSE

Expert Assermenté auprès des Tribunaux

الدكتور محمد عجوبي

اختصاصي في أمراض الكلى

الكلية الاصطناعية

خبير ملحق لدى المحاكم

29/08/2019

Casablanca, le :

Demandeur : ZAFARAT

$$149.70 \times 3 = 449.10$$

- DIPRIZAR Fort.

115

N°3

$$125.00 \times 3 = 375.00$$

- AMAREL Lysine

Centre Hémodialyse Privé IBN ROCHD

Docteur Mohamed IBN ROCHD

3, Rue Abou Bakr Mohamed Ibn Zouhair

Quartier des Hôpitaux - Casablanca

Tel.: 05 22 26 40 50 - Fax : 05 22 27 87 89

PHARMACIE HAY EL HASSAN
Dr. AKOUZ KERIM
50-52, Lot 3, Villa 1832
Hay Hassane, Casablanca
Tel.: 05 22 20 35 22

$$46.70$$

- Zephoric 40 mg

115

N°3

$$63.20 \times 3 = 189.60$$

- Zynotec 40 mg

115

N°3

$$75.20 \times 3 = 225.60$$

- ANGLOT

115

N°3

$$27.50$$

- SPASFOR 80 mg

115

N°3

$$52.80$$

- PROZOL 20 mg

115

N°3

$$215$$

- PROZOL 20 mg

115

N°3

$$1366,30$$

Traitement 03 mois

Centre Hémodialyse Privé IBN ROCHD

Docteur Mohamed AJOUBY

NEPHROLOGUE

3, Rue Abou Bakr Mohamed Ibn Zouhair

Quartier des Hôpitaux - Casablanca

Tel.: 05 22 26 20 50 - Fax : 05 22 27 87 89

3, rue Abou Baker Mohamed Ibn Zouhair, Quartier des Hôpitaux - Casablanca
Tél.: 05 22 26 20 50 - Fax : 05 22 99 28 01 - Patente : 36315420 - CNSS : 6344874 - INP : 0900074 / 41015

DIPREZAR FORT®

Losartan 100 mg + Hydrochlorothiazide 25 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre.

Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

DIPREZAR FORT®, comprimé pelliculé :

- Les substances actives sont : le losartan potassique et l'hydrochlorothiazide.
- Autres composants : cellulose microcristalline, mannitol, amidon pré-gélatinisé, povidone, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium. Pelliculage : Opadry jaune.
- Excipient à effet notoire : mannitol.

1 - QU'EST-CE QUE DIPREZAR FORT®, ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Comprimé pelliculé dosé à 100 mg de Losartan potassium et 25 mg d'hydrochlorothiazide. Association fixe d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

Hypertension artérielle insuffisamment contrôlée par l'association de losartan potassique à 50 mg/jour et l'hydrochlorothiazide à 12,5 mg/jour.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE DIPREZAR FORT® ?

Ne pas prendre DIPREZAR FORT®, dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à l'un des constituants,
- si vous êtes allergique aux dérivés sulfamidés,

F 149,70
EUT 142

149,70

des dérivés sulfamidés,

ou des reins,
tères rénales,
grossesse,

, la prescription de DIPREZAR
as suivants :
osseuse.



DIPREZAR FORT® :

votre pharmacien des problèmes médicaux ainsi que des allergies que vous avez ou que vous avez eus. Informez votre médecin si vous avez des problèmes de foie ou de reins, de goutte, si vous avez du diabète, un lupus érythémateux ou si vous avez été traité avec des diurétiques.

Informez votre médecin si vous avez eu récemment des vomissements ou diarrhées en grande quantité.

Sportifs, attention : cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors du contrôle antidopage.

Grossesse - Allaitement :


Si vous êtes enceinte ou envisagez une grossesse, prévenez votre médecin avant de prendre ce médicament. En effet, ce médicament est déconseillé au cours du 1^{er} trimestre de la grossesse et *il est contre-indiqué durant les 2^{ème} et 3^{ème} trimestres de la grossesse.*

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

L'utilisation de DIPREZAR FORT® est contre-indiquée au cours de l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de DIPREZAR FORT®, AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment en cas d'association au lithium, aux diurétiques épargneurs de potassium, au potassium (sels de), au sultopride.



DIPREZAR FORT®

Losartan 100 mg + Hydrochlorothiazide 25 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre.

Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

DIPREZAR FORT®, comprimé pelliculé :

- Les substances actives sont : le losartan potassique et l'hydrochlorothiazide.

- Autres composants : cellulose microcristalline, mannitol, amidon pré-gélatinisé, povidone, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium. Pelliculage : Opadry jaune.

- Excipient à effet notable : mannitol.

1 - QU'EST-CE QUE DIPREZAR FORT®, ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Comprimé pelliculé dosé à 100 mg de Losartan potassium et 25 mg d'hydrochlorothiazide. Association fixe d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

Hypertension artérielle insuffisamment contrôlée par l'association de losartan potassique à 50 mg/jour et l'hydrochlorothiazide à 12,5 mg/jour.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DIPREZAR FORT® ?

Ne pas prendre DIPREZAR FORT®, dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à l'un des constituants,
- si vous êtes allergique aux dérivés sulfamidés,

PIV 142
CUT 142
EUT 142

149,70

des dérivés sulfamidés,
ou des reins,
tères rénales,
grossesse,

, la prescription de DIPREZAR®
as suivants :
osseuse.



DIPREZAR FORT® :
votre pharmacien des problèmes
médicaux ainsi que des allergies que vous avez ou que vous avez
eus. Informez votre médecin si vous avez des problèmes de foie ou
de reins, de goutte, si vous avez du diabète, un lupus érythémateux
ou si vous avez été traité avec des diurétiques.

Informez votre médecin si vous avez eu récemment des vomissements ou diarrhées en grande quantité.

Sportifs, attention : cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors du contrôle antidopage.

Grossesse - Allaitement :

Si vous êtes enceinte ou envisagez une grossesse, prévenez votre médecin avant de prendre ce médicament. En effet, ce médicament est déconseillé au cours du 1^{er} trimestre de la grossesse et il est contre-indiqué durant les 2^{ème} et 3^{ème} trimestres de la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

L'utilisation de DIPREZAR FORT® est contre-indiquée au cours de l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de DIPREZAR FORT®, AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, notamment en cas d'association au lithium, aux diurétiques épargneurs de potassium, au potassium (sels de), au sultopride.



DIPREZAR FORT®

Losartan 100 mg + Hydrochlorothiazide 25 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre.

Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

DIPREZAR FORT®, comprimé pelliculé :

- Les substances actives sont : le losartan potassique et l'hydrochlorothiazide.

- Autres composants : cellulose microcristalline, mannitol, amidon prégalatinisé, povidone, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium. Pelliculage : Opadry jaune.

- Excipient à effet notoire : mannitol.

1 - QU'EST-CE QUE DIPREZAR FORT®, ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Comprimé pelliculé dosé à 100 mg de Losartan potassium et 25 mg d'hydrochlorothiazide. Association fixe d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

Hypertension artérielle insuffisamment contrôlée par l'association de losartan potassique à 50 mg/jour et l'hydrochlorothiazide à 12,5 mg/jour.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DIPREZAR FORT® ?

Ne pas prendre DIPREZAR FORT®, dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à l'un des constituants,
- si vous êtes allergique aux dérivés sulfamidés,

FIX 3110
P 142
LOT 142

149,70

des dérivés sulfamidés,

ou des reins,
tères rénales,
grossesse,

la prescription de DIPREZAR
les suivants :
grossesse.



DIPREZAR FORT® :

d'après votre pharmacien des problèmes médicaux ainsi que des allergies que vous avez ou que vous avez eus. Informez votre médecin si vous avez des problèmes de foie ou de reins, de goutte, si vous avez du diabète, un lupus érythémateux ou si vous avez été traité avec des diurétiques.

Informez votre médecin si vous avez eu récemment des vomissements ou diarrhées en grande quantité.

Sportifs, attention : cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors du contrôle antidopage.

Grossesse - Allaitement :

Si vous êtes enceinte ou envisagez une grossesse, prévenez votre médecin avant de prendre ce médicament. En effet, ce médicament est déconseillé au cours du 1^{er} trimestre de la grossesse et il est contre-indiqué durant les 2^{ème} et 3^{ème} trimestres de la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

L'utilisation de DIPREZAR FORT® est contre-indiquée au cours de l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de DIPREZAR FORT®, AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment en cas d'association au lithium, aux diurétiques épargneurs de potassium, au potassium (sels de), au sultopride.



Co-Amarel®

2 mg/500 mg

Glimépiride / chlorhydrate de Me Comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin d'en lire une partie.
- Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit et doit être pris comme il a été recommandé par votre pharmacien ou votre médecin.

Co-Amarel 2mg/500mg, comprimé pelliculé

- Les substances actives sont le glimépiride et le chlorhydrate de metformine.

Un comprimé contient 2 mg de glimépiride et 500 mg de chlorhydrate de metformine.

- Les autres composants sont : lactose, carboxyméthylamidon, povidone K 30, cellulose microcristalline, crospovidone, stéarate de magnésium, hydroxypropylméthylcellulose, polyéthylène glycol 6000, dioxyde de titane (E 171), cire de carnauba, eau purifiée.

1. QU'EST-CE QUE Co-Amarel ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Co-Amarel se présente sous forme de comprimés pelliculés blancs de forme ovale. Boîte de 30 comprimés.

Co-Amarel est un antidiabétique oral.

Il est préconisé dans le traitement du diabète sucré ne nécessitant pas d'insuline (diabète de type 2), en complément d'un régime alimentaire et d'exercice physique :

- lorsqu'un traitement par monothérapie à base de glimépiride ou de metformine n'est pas suffisant pour rétablir l'équilibre glycémique,
- en remplacement de la bithérapie associant glimépiride et metformine.

2. INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT D'UTILISER

Co-Amarel

N'utilisez jamais Co-Amarel dans les cas suivants :

- si vous souffrez de diabète insulino-dépendant (diabète de type 1 nécessitant un traitement par

125,00



- si vous souffrez d'une maladie de l'appareil digestif,
- si vous êtes hypersensible (allergique) au glimépiride ou au chlorhydrate de metformine, ou à l'un des autres composants de Co-Amarel, aux sulfamides et autres sulfonylurées, aux biguanides,
- si vous êtes enceinte ou si vous allaitez votre enfant,
- si vous avez déjà souffert d'acidose lactique,
- si vous souffrez d'une maladie ou d'un dysfonctionnement des reins,
- si vous souffrez d'insuffisance cardiaque,
- si vous avez eu récemment un infarctus du myocarde, un choc,
- si vous souffrez d'une atteinte hépatique grave,
- si vous consommez de l'alcool de manière excessive (intoxication alcoolique aiguë, alcoolisme),
- si vous souffrez d'une infection sévère, de déshydratation,
- en cas d'exploration radiologique nécessitant l'utilisation de produits de contraste iodés. Vous devrez arrêter votre traitement Co-Amarel au moment de l'examen et pendant quelques jours après l'examen.
- si vous ne vous alimentez pas correctement, si vous êtes affaibli ou souffrez d'insuffisance hypophysaire ou surrenale.

Prendre des précautions particulières avec Co-Amarel :
Veuillez respecter consciencieusement les prescriptions de votre médecin pour ce qui concerne les doses de Co-Amarel, la surveillance (analyse de sang et d'urine), le régime alimentaire et l'activité physique (travail et exercice physique).

MISES EN GARDE

Hypoglycémie :

Au cours des premières semaines de traitement, le risque

Co-Amarel®

2mg/500mg

Glimépiride / chlorhydrate de Metformine Comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin d'y faire référence.
- Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit et doit être pris comme il a été recommandé par votre médecin. Ne le prenez pas si quelqu'un d'autre vous l'a donné, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

125,00



Co-Amarel 2mg/500mg, comprimé pelliculé

- Les substances actives sont le glimépiride et le chlorhydrate de metformine. Un comprimé contient 2 mg de glimépiride et 500 mg de chlorhydrate de metformine.
- Les autres composants sont : lactose, carboxyméthylamidon, povidone K 30, cellulose microcristalline, crospovidone, stéarate de magnésium, hydroxypropylméthylcellulose, polyéthylène glycol 6000, dioxyde de titane (E 171), cire de carnauba, eau purifiée.

1. QU'EST-CE QUE Co-Amarel ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Co-Amarel se présente sous forme de comprimés pelliculés blancs de forme ovale. Boîte de 30 comprimés.

Co-Amarel est un antidiabétique oral.

Il est préconisé dans le traitement du diabète sucré ne nécessitant pas d'insuline (diabète de type 2), en complément d'un régime alimentaire et d'exercice physique :

- lorsqu'un traitement par monothérapie à base de glimépiride ou de metformine n'est pas suffisant pour rétablir l'équilibre glycémique,
- en remplacement de la bithérapie associant glimépiride et metformine.

2. INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT D'UTILISER Co-Amarel

N'utilisez jamais Co-Amarel dans les cas suivants :

- si vous souffrez de diabète insulino-dépendant (diabète de type 1 nécessitant un traitement par

- si vous souffrez d'une maladie de l'estomac ou de l'intestin,
- si vous êtes hypersensible (allergique) au glimépiride ou au chlorhydrate de metformine, ou à l'un des autres composants de Co-Amarel, aux sulfamides et autres sulfonylurées, aux biguanides,
- si vous êtes enceinte ou si vous allaitez votre enfant,
- si vous avez déjà souffert d'acidose lactique,
- si vous souffrez d'une maladie ou d'un dysfonctionnement des reins,
- si vous souffrez d'insuffisance cardiaque,
- si vous avez eu récemment un infarctus du myocarde, un choc,
- si vous souffrez d'une atteinte hépatique grave,
- si vous consommez de l'alcool de manière excessive (intoxication alcoolique aiguë, alcoolisme),
- si vous souffrez d'une infection sévère, de déshydratation,
- en cas d'exploration radiologique nécessitant l'utilisation de produits de contraste iodés. Vous devrez arrêter votre traitement Co-Amarel au moment de l'examen et pendant quelques jours après l'examen.
- si vous ne vous alimentez pas correctement, si vous êtes affaibli ou souffrez d'insuffisance hypophysaire ou surrenale.

Prendre des précautions particulières avec Co-Amarel :
Veuillez respecter consciencieusement les prescriptions de votre médecin pour ce qui concerne les doses de Co-Amarel, la surveillance (analyse de sang et d'urine), le régime alimentaire et l'activité physique (travail et exercice physique).

MISES EN GARDE

Hypoglycémie :

Au cours des premières semaines de traitement, le risque

Co-Amarel®

2 mg/500 mg

Glimépiride / chlorhydrate de Metformine Comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin d'en lire une partie.
- Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit et il ne devrait pas causer du tort, même si elle présente les noms de deux personnes.

Co-Amarel 2mg/500mg, comprimé pelliculé

- Les substances actives sont le glimépiride et le chlorhydrate de metformine.

Un comprimé contient 2 mg de glimépiride et 500 mg de chlorhydrate de metformine.

- Les autres composants sont : lactose, carboxyméthylamidon, povidone K 30, cellulose microcristalline, crospovidone, stéarate de magnésium, hydroxypropylméthylcellulose, polyéthylène glycol 6000, dioxyde de titane (E 171), cire de carnauba, eau purifiée.

1. QU'EST-CE QUE Co-Amarel ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Co-Amarel se présente sous forme de comprimés pelliculés blancs de forme ovale. Boîte de 30 comprimés.

Co-Amarel est un antidiabétique oral.

Il est préconisé dans le traitement du diabète sucré ne nécessitant pas d'insuline (diabète de type 2), en complément d'un régime alimentaire et d'exercice physique :

- lorsqu'un traitement par monothérapie à base de glimépiride ou de metformine n'est pas suffisant pour rétablir l'équilibre glycémique,
- en remplacement de la bithérapie associant glimépiride et metformine.

2. INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT D'UTILISER

Co-Amarel

N'utilisez jamais Co-Amarel dans les cas suivants :

- Si vous souffrez de diabète insulino-dépendant (diabète de type 1 nécessitant un traitement par

125,00



- si vous souffrez d'acidose.
- si vous êtes hypersensible (allergique) au glimépiride ou au chlorhydrate de metformine, ou à l'un des autres composants de Co-Amarel, aux sulfamides et autres sulfonylurées, aux biguanides,
- si vous êtes enceinte ou si vous allaitez votre enfant,
- si vous avez déjà souffert d'acidose lactique,
- si vous souffrez d'une maladie ou d'un dysfonctionnement des reins,
- si vous souffrez d'insuffisance cardiaque,
- si vous avez eu récemment un infarctus du myocarde, un choc,
- si vous souffrez d'une atteinte hépatique grave,
- si vous consommez de l'alcool de manière excessive (intoxication alcoolique aiguë, alcoolisme),
- si vous souffrez d'une infection sévère, de déshydratation,
- en cas d'exploration radiologique nécessitant l'utilisation de produits de contraste iodés. Vous devrez arrêter votre traitement Co-Amarel au moment de l'examen et pendant quelques jours après l'examen.
- si vous ne vous alimentez pas correctement, si vous êtes affaibli ou souffrez d'insuffisance hypophysaire ou surrenale.

Prendre des précautions particulières avec Co-Amarel :
Veuillez respecter consciencieusement les prescriptions de votre médecin pour ce qui concerne les doses de Co-Amarel, la surveillance (analyse de sang et d'urine), le régime alimentaire et l'activité physique (travail et exercice physique).

MISES EN GARDE

Hypoglycémie :

Au cours des premières semaines de traitement, le risque



l'allopurinol et contactez

ZYLORIC® 100 mg, 200 mg

ALLOPU

Veuillez lire attentivement l'intégralité du médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir d'autres questions, demandez à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de santé ou d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, mais pas identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

31,30



Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Etes d'origine chinoise, ethnies Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

- Médicaments pour les maladies cardiaques comme des IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine) (pour éliminer l'acide urique)
 - Médicaments utilisés pour empêcher la coagulation (par exemple warfarine)
 - Tous autres médicaments utilisés pour empêcher la coagulation. Veuillez avertir votre médecin si vous avez récemment pris tout autre médicament sans ordonnance, y compris les vitamines.
- Grossesse et allaitement :**
Si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte, ou si vous planifiez une grossesse, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament. L'utilisation de ce médicament pendant la grossesse n'a pas été étudiée. En raison du passage dans le lait maternel, il est conseillé de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Conduite de véhicules et conduite de machines

Dans de rares cas, la prise de ZYLORIC peut entraîner des étourdissements, des vertiges, ou une perte de coordination. Ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines.

Liste des excipients à éviter

Si votre médecin vous a prescrit ZYLORIC, comprimé, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament. L'utilisation de ce médicament peut entraîner une intolérance au galactose ou une malabsorption du glucose.

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Veuillez à toujours prendre ZYLORIC, comprimé exactement comme recommandé par votre médecin ou pharmacien.

Les comprimés doivent être pris avec de l'eau et mangés avec des aliments.

Posologie

La posologie recommandée est de 100 mg par jour.

Les posologies recommandées sont les suivantes : Vous commencerez généralement par 100 mg par jour, puis augmenterez progressivement jusqu'à 200 mg par jour.

Si vous êtes âgé(e) ou si vous avez des problèmes de santé, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible. Les prises du médicament doivent être espacées de 24 heures. La posologie recommandée pour les personnes âgées ou malades est de 100 mg par jour.

Utilisation chez les enfants et les adolescents : Les posologies habituelles sont recommandées.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Les comprimés sont à prendre avec de l'eau ou avec des aliments.

ZYLORIC® 100 mg, 200 mg

ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité du médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir des questions.
- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été prescrit par un autre professionnel de la santé ou une autre personne. Il pourrait leur être nocif, mais identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

31,30



Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Etes d'origine chinoise, ethnies Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

l'allopurinol et contactez immédiatement votre médecin.

Medicaments pour les maladies cardiaques comme des IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine), diurétiques (pour éliminer l'eau et la sel), warfarine

Tout autre médicament utilisé pour traiter une maladie. Veuillez avertir votre médecin de tout autre médicament récemment pris tout autre que celui prescrit sans ordonnance, y compris les vitamines.

Grossesse et allaitement :

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez que vous pouvez être enceinte, avalez de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament pendant la grossesse n'a pas été étudiée.

En raison du passage du médicament dans le lait maternel, il est conseillé de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Conduite de véhicules et pilotage : Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des étourdissements, des vertiges, ou une perte de coordination qui peuvent empêcher de conduire un véhicule ou de faire des travaux nécessitant une grande vigilance.

Liste des excipients à effets secondaires :

Si votre médecin vous a donné ce médicament, contactez votre médecin au plus tôt. L'utilisation de ce médicament peut entraîner une intolérance au galactose, une malabsorption du glucose et de l'acide galactosique.

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC ?

Veillez à toujours prendre ce médicament exactement comme il a été prescrit par votre médecin ou pharmacien.

Les comprimés doivent être avalés avec un peu d'eau.

Posologie :

La posologie recommandée est de 1 comprimé par jour.

Les posologies recommandées sont généralement de 1 comprimé par jour.

Si vous êtes âgé(e) ou si vous avez une maladie chronique, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus élevée.

Les posologies recommandées sont généralement de 1 comprimé par jour.

Les posologies recommandées sont généralement de 1 comprimé par jour.

Les posologies recommandées sont généralement de 1 comprimé par jour.

Les posologies recommandées sont généralement de 1 comprimé par jour.

ZYLORIC® 100 mg, 200 mg

ALLOPURINOL

l'allopurinol et contactez

Veuillez lire attentivement l'intégralité du médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin d'y faire référence.
- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre pharmacien ou à votre infirmier.
- Ce médicament vous a été prescrit par un médecin. Il peut également être prescrit à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, mais pas nécessairement. Les effets peuvent être identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

31,30



Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
- Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
- Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Etes d'origine chinoise, ethnies Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

• Médicaments pour les maladies cardiaques comme des IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine) et les diurétiques (pour éliminer l'eau et la sel du corps).

• Médicaments utilisés pour empêcher la coagulation (par exemple la warfarine).

• Tous autres médicaments utilisés pour empêcher la coagulation. Veuillez avertir votre médecin si vous avez récemment pris tout autre médicament sans ordonnance, y compris les vitamines.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez que vous êtes enceinte, ou si vous planifiez une grossesse, avalez de prendre ce médicament. L'utilisation de ce médicament pendant la grossesse n'a pas été étudiée. En raison du passage de l'acide urique dans le lait maternel, il est conseillé de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Conduite de véhicules et conduite de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des étourdissements, des vertiges, ou une perte de coordination. Ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines.

Liste des excipients à effet connu

Si votre médecin vous a donné ce médicament, il vous a probablement recommandé de le prendre avec un repas. Contactez votre médecin ou pharmacien si vous avez des difficultés à prendre ce médicament. L'utilisation de ce médicament peut entraîner une intolérance au galactose, une malabsorption du glucose et/ou de l'acide urique.

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC

Veuillez à toujours prendre ce médicament avec un repas. Contactez votre médecin ou pharmacien si vous avez des difficultés à prendre ce médicament.

Les comprimés doivent être pris avec un repas.

Posologie

La posologie recommandée est de 100 mg par jour.

Les posologies recommandées sont généralement de 100 mg par jour.

Si vous êtes âgé(e) ou si vous avez des problèmes de santé, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible. Les prises du médicament doivent être espacées de 24 heures.

Si vous êtes âgé(e) ou si vous avez des problèmes de santé, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible. Les prises du médicament doivent être espacées de 24 heures.

Utilisation chez les enfants et adolescents : Les posologies recommandées sont généralement de 100 mg par jour.

Mode et voie d'administration : La forme pharmaceutique recommandée est la forme orale.

Les comprimés sont à prendre avec un repas.

ANGLOR®

Amlodipine

Boîte de 30 comprimés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

*Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

*Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

*Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

*Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Composition du médicament :

ANGLOR® 5 mg

*Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :
Amlodipine Besilate 6,935 mg
Quantité correspondant à amlodipine 5 mg

ANGLOR® 10 mg

*Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :
Amlodipine Besilate 13,870 mg
Quantité correspondant à amlodipine 10 mg

*Composition qualitative en excipients :

Cellulose microcristalline, calcium hydrogen phosphate anhydre, amidon de maïs desséché type A, Stéarate de magnésium.

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ANGLOR® contient la substance active amlodipine qui appartient au groupe de médicaments appelés inhibiteurs calciques.

3. Indications thérapeutiques :

ANGLOR® est utilisé pour traiter l'augmentation de la pression artérielle [hypertension], ou un certain type de douleur thoracique dénommée angor, dont une forme rare est l'angor de Prinzmetal.

Chez les patients présentant des valeurs élevées de la pression artérielle, ce médicament agit en relaxant les vaisseaux sanguins, de telle sorte que le sang les traverse plus facilement. Chez les patients atteints d'angor, ANGLOR® agit en améliorant l'apport sanguin au muscle cardiaque, qui reçoit ainsi plus d'oxygène, ce qui prévient l'apparition d'une douleur thoracique. Ce médicament n'apporte pas de soulagement immédiat pour la douleur thoracique liée à l'angor.

4. Posologie :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La posologie initiale recommandée d'ANGLOR® est de 5 mg une fois par jour. Cette dose peut être augmentée jusqu'à 10 mg d'ANGLOR® une fois par jour.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Pour les enfants et les adolescents [de 6 à 17 ans], la dose initiale habituelle recommandée est de 2,5 mg par jour. La dose maximale recommandée est de 5 mg par jour. Les comprimés d'ANGLOR® à 2,5 mg ne sont actuellement pas disponibles.

• Mode d'administration

Voie orale.

Ce médicament peut être utilisé avant ou après la consommation d'aliments et de boissons. Il est préférable de prendre ce médicament à la même heure tous les jours avec un verre d'eau. Ne prenez pas ANGLOR® avec du jus de pamplemousse.

Durée du traitement

Il est très important de continuer à prendre votre traitement. Pensez à consulter votre médecin avant de ne plus avoir de comprimé.

5. Contre-indications :

Ne prenez jamais ANGLOR®, comprimé :

* Si vous êtes allergique [hypersensible] à l'amlopipine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, ou aux autres inhibiteurs calciques. Cela peut se manifester par des démangeaisons, des rougeurs de la peau ou des difficultés respiratoires.

* Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle [hypotension].

* Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique [sténose aortique] ou un choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur était incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).

* Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

6. Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants après la prise de ce médicament.

• Respiration sifflante soudaine, douleur thoracique,
• Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres,
• Gonflement de l'estomac.

77,00
IPV 770HCO
PER 1/1
LOT 1129



* Crampes musculaires.

D'autres effets indésirables figurant sur la liste suivante peuvent également survenir. Veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables peu fréquents : pouvant affecter jusqu'à 1% des patients.
• Changement de l'humeur, anxiété, dépression, insomnie.
• Tremblements, anomalies du goût, perte de conscience.
• Sensations d'engourdissement ou de fourmillements.
• Tintements dans les oreilles.
• Diminution de la pression artérielle.
• Éternuements et écoulement nasal provoqués par un rhume.

• Toux.
• Bouche sèche, vomissements [nausées].
• Chute des cheveux, augmentation de la transpiration, peau, changement de coloration de la peau.

• Difficultés pour uriner, augmentation des envies d'uriner.
• Incapacité d'obtenir une érection, gêne ou augmentation de la taille de la prostate.

• Douleur, malaise.
• Douleurs articulaires ou musculaires, douleurs dorsales.
• Augmentation ou diminution du poids.

Effets indésirables rares : pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1000.

• Confusion.

Effets indésirables très rares : pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10 000.

• Diminution du nombre des globules blancs, diminution ou formation anormale d'hématoxyles ou des saignements.

• Augmentation du sucre dans le sang [hyperglycémie].
• Troubles des nerfs entraînant une faiblesse, des fourmillements.

• Gonflement des gencives.
• Ballonnement abdominal [gastrite].

• Anomalies de la fonction hépatique, inflammation élevée des enzymes hépatiques pouvant avoir un effet sur la fonction hépatique.

• Augmentation de la tension musculaire.
• Inflammation des vaisseaux sanguins, souvent accompagnée d'ulcères.

• Sensibilité à la lumière.
• Troubles combinant de la rigidité, des tremblements et des convulsions.

7. Mises en garde spéciales et précautions particulières :

Mises en garde et précautions d'emploi : Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre pharmacie.

Vous devez informer votre médecin si vous présentez :

* Crise cardiaque récente,
• Insuffisance cardiaque,
• Augmentation sévère de la pression artérielle (crise d'angor),
• Maladie du foie,
• Vous êtes une personne âgée et votre dose a besoin d'être adaptée.

Enfants et adolescents : ANGLOR® n'a pas été étudié chez l'enfant âgé de moins de 16 ans. Pour les enfants et les adolescents, veuillez vous adresser à votre médecin.

8. Interactions :

*Interactions avec d'autres médicaments : Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez pris un autre médicament obtenu sans ordonnance.

ANGLOR® peut affecter ou être affecté par d'autres médicaments.

* Le klonazepam, l'itraconazole [médicaments antifongiques], le ritonavir, l'indinavir, le neffinavir [appelés inhibiteurs de la VIH].

* La rifampicine, l'érythromycine, la clarithromycine [antibiotiques].

* Hypericum perforatum [millepertuis].

* Le vérapamil, le diltiazem [médicaments pour le cœur].

* La dantrolène [perfusion pour les augmentations sévères de la température].

* La simvastatine [médicament utilisé pour réduire le cholestérol].

* La cyclosporine [médicament immunosupresseur].

ANGLOR® peut diminuer votre pression artérielle. Consultez votre pharmacien ou votre médecin.



ANGLOR®

Amlodipine

Boîte de 30 comprimés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

• Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Composition du médicament :

ANGLOR® 5 mg

• Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise ;
Amlodipine Besilate 6,935 mg
Quantité correspondant à amlodipine..... 5 mg

ANGLOR® 10 mg

• Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise ;
Amlodipine Besilate 13,870 mg
Quantité correspondant à amlodipine..... 10 mg

• Composition qualitative en excipients :

Cellulose microcristalline, calcium hydrogén phosphate anhydre, amidon de maïs desséché type A, Stéarate de magnésium.

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ANGLOR® contient la substance active amlodipine qui appartient au groupe de médicaments appelés inhibiteurs calciques.

3. Indications thérapeutiques :

ANGLOR® est utilisé pour traiter l'augmentation de la pression artérielle [hypertension], ou un certain type de douleur thoracique dénommée angor, dont une forme rare est l'angor de Prinzmetal.

Chez les patients présentant des valeurs élevées de la pression artérielle, ce médicament agit en relaxant les vaisseaux sanguins, de telle sorte que le sang les traverse plus facilement. Chez les patients atteints d'angor, ANGLOR® agit en améliorant l'apport sanguin au muscle cardiaque, qui reçoit ainsi plus d'oxygène, ce qui prévient l'apparition d'une douleur thoracique. Ce médicament n'apporte pas de soulagement immédiat pour la douleur thoracique liée à l'angor.

4. Posologie :

VEillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Veuillez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La posologie initiale recommandée d'ANGLOR® est de 5 mg une fois par jour. Cette dose peut être augmentée jusqu'à 10 mg d'ANGLOR® une fois par jour.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Pour les enfants et les adolescents (de 6 à 17 ans), la dose initiale habituelle recommandée est de 2,5 mg par jour. La dose maximale recommandée est de 5 mg par jour. Les comprimés d'ANGLOR® à 2,5 mg ne sont actuellement pas disponibles.

• Mode d'administration

Voie orale.

Ce médicament peut être utilisé avant ou après la consommation d'aliments et de boissons. Il est préférable de prendre ce médicament à la même heure tous les jours avec un verre d'eau. Ne prenez pas ANGLOR® avec du jus de pamplemousse.

• Durée du traitement

Il est très important de continuer à prendre votre traitement. Pensez à consulter votre médecin avant de ne plus avoir de comprimé.

5. Contre-indications :

Ne prenez jamais ANGLOR®, comprimé.

• Si vous êtes allergique [hypersensible] à l'amiodipine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, ou aux autres inhibiteurs calciques. Cela peut se manifester par des démangeaisons, des rougeurs de la peau ou des difficultés respiratoires.

• Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle [hypotension].

• Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique [sténose aortique] ou un choc cardiogénique [une affection dans laquelle votre cœur était incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme].


• Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

6. Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants après la prise de ce médicament.

- Respiration sifflante soudaine, douleur thoracique, essoufflement.
 - Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres, éruption cutanée.
 - Gonflement des pieds.
- 77,00**
- IPV 770 HCO
PE 1 / 1
LOT 1129



• Crampes musculaires.

D'autres effets indésirables figurant sur la liste suivante peuvent être comme grave ou si vous présentez des effets indésirables peu fréquents, pourrez informer votre pharmacien ou votre médecin.

Effets indésirables peu fréquents : pouvant affecter jusqu'à 1% des patients.
 • Changement de l'humeur, anxiété, dépression, insomnie.

• Tremblements, anomalies du goût, perte de conscience.

• Sensations d'engourdissement ou de fourmillements.

• Tintements dans les oreilles.

• Diminution de la pression artérielle.

• Éternuements et écoulement nasal provoqués par une rhinite.

• Bouche sèche, vomissements (nausées).

• Chute des cheveux, augmentation de la transpiration, peau, changement de coloration de la peau.

• Difficultés pour uriner, augmentation des envies d'uriner.

• Incapacité d'obtenir une érection, gêne ou augmentation de la taille.

• Douleur, malaise.

• Douleurs articulaires ou musculaires, douleurs dorsales.

• Augmentation ou diminution du poids.

Effets indésirables rares : pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1000.

Effets indésirables très rares : pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10 000.

• Diminution du nombre des globules blancs, diminution formation anormale d'hématoxylos ou des saignements.

• Augmentation du sucre dans le sang [hyperglycémie].

• Troubles des nerfs entraînant une faiblesse, des fourmillements.

• Gonflement des gencives.

• Ballonnemment abdominal [gastrite].

• Anomalies de la fonction hépatique, inflammation et élévation des enzymes hépatiques pouvant avoir un effet sur la fonction hépatique.

• Augmentation de la tension musculaire.

• Inflammation des vaisseaux sanguins, souvent accompagnée de fièvre.

• Sensibilité à la lumière.

• Troubles combinant de la rigidité, des tremblements.

7. Mises en garde spéciales et précautions particulières

Mises en garde et précautions, d'emploi.

Adresssez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre dentiste.

Vous devez informer votre médecin si vous présentez :

• Crise cardiaque récente,

• Insuffisance cardiaque,

• Augmentation sévère de la pression artérielle (crise artérielle),

• Maladie du foie,

• Vous êtes une personne âgée et votre dose a besoin d'être adaptée.

Enfants et adolescents

ANGLOR® n'a pas été étudié chez les enfants et les adolescents. Pour le traitement de l'hypertension chez les enfants et les adolescents, veuillez vous adresser à votre médecin.

8. Interactions :

• Interactions avec d'autres médicaments :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez pris un médicament obtenu sans ordonnance.

ANGLOR® peut affecter ou être affecté par d'autres médicaments.

• Le ketoconazole, l'itraconazole (médicaments antifongiques),

• Le ritonavir, l'indinavir, le neflifavir (appelés inhibiteurs de la VIH),

• La rifampicine, l'érythromycine, la clarithromycine (clarithromycine),

• Hypericum perforatum (millepertuis),

• le vérapamil, le diltiazem (médicaments pour le cœur),

• le dométhasone (pour l'application sévère de la rhinite),

• la simvastatine (médicament utilisé pour réduire le cholestérol),

• la ciclopisporine (médicament immunosuppresseur).

ANGLOR® peut diminuer votre pression artérielle. Certains médicaments destinés à traiter l'augmentation de la

ZYRTEC® 10 mg, comprimé pelliculé sécable
ZYRTEC® 10 mg/ml, solution buvable en gouttes
ZYRTEC® 1 mg/ml, solution buvable en flacon
Dichlorhydrate de céftrizine



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de nécessité.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, contactez votre pharmacien.

63,20

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ZYRTEC ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYRTEC ?
3. COMMENT PRENDRE ZYRTEC ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ZYRTEC ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ZYRTEC ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Le dichlorhydrate de céftrizine est la substance active de ZYRTEC.
ZYRTEC est un médicament antihistaminique utilisé dans le traitement de l'allergie.

ZYRTEC solution buvable en gouttes et Zyrtec solution buvable en flacon sont indiqués chez l'adulte et l'enfant à partir de 2 ans :
ZYRTEC comprimé est indiqué chez l'adulte et l'enfant à partir de 6 ans :

- Pour le traitement des symptômes nasaux et oculaires de la rhinite allergique saisonnière ou perannuelle.
- Pour le traitement des symptômes de l'urticaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYRTEC ?

Ne prenez jamais ZYRTEC

- Si vous avez une maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère avec une clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min).
- Si vous êtes allergique au dichlorhydrate de céftrizine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir rubrique 6 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES), à l'hydroxyzine ou aux dérivés de la pipérazine (substances actives apparentées contenues dans d'autres médicaments).

Faites attention avec ZYRTEC

Si vous avez une insuffisance rénale, demandez conseil à votre médecin ; si nécessaire, vous devrez prendre une dose inférieure. La posologie adaptée sera déterminée par votre médecin.

Si vous êtes épileptique ou si vous présentez des risques de convulsions, demandez conseil à votre médecin.

Il n'a pas été observé d'interaction spécifique entre la céftrizine utilisée aux doses recommandées et l'alcool (jusqu'à la concentration sanguine d'alcool de 0,5 pour mille (g/l) correspondant à un verre de vin).

Toutefois, aucune donnée n'est disponible lors de la prise de doses plus importantes de céftrizine et d'alcool. Par conséquent, comme avec tout autre antihistaminique, il est recommandé d'éviter la prise d'alcool avec ZYRTEC.

Si vous devez subir des tests pour le diagnostic de l'allergie (test cutané par exemple), il convient d'arrêter de prendre ce médicament au moins 3 jours avant leur réalisation car il peut en modifier les résultats. Demandez à votre médecin ce qu'il convient de faire avant la réalisation des tests pour le diagnostic de l'allergie.

Prise d'autres médicaments

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez pris récemment ou pourriez prendre tout autre médicament.

Aliments et boissons

L'absorption de la céftrizine contenue dans ZYRTEC n'est pas modifiée par la prise concomitante d'aliments.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ZYRTEC doit être évitée pendant la grossesse. L'utilisation par inadvertance en cours de grossesse ne devrait pas avoir d'effet délétère sur le fœtus. Cependant, ce médicament devra être administré uniquement si nécessaire et après avis médical.

La céftrizine passe dans le lait maternel. Par conséquent, vous ne devez pas prendre ZYRTEC pendant l'allaitement sans avoir demandé l'avis de votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Les études cliniques n'ont pas mis en évidence d'altération de la vigilance, du temps de réaction ou de la capacité à conduire après administration de ZYRTEC aux doses recommandées.

Cependant si vous êtes susceptible de conduire un véhicule, de faire des activités potentiellement dangereuses ou d'utiliser des machines, vous devez évaluer au préalable votre propre réaction au traitement par ZYRTEC.

Vous ne devez pas dépasser la dose recommandée.

Informations importantes concernant certains composants de ZYRTEC

ZYRTEC, comprimé contient du lactose, si votre médecin vous a informé(e) que vous aviez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

ZYRTEC, solution buvable en flacon contient du sorbitol. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

ZYRTEC, solution buvable en gouttes et ZYRTEC, solution buvable en flacon contiennent du parahydroxybenzoate de méthyle et du parahydroxybenzoate de propyle qui peuvent provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

3. COMMENT PRENDRE ZYRTEC ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en respectant la prescription de votre médecin ou les indications de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Zytec, comprimé :

Les comprimés doivent être avalés avec une boisson.

Le comprimé peut être divisé en 2 doses égales.

ZYRTEC, solution buvable en flacon :

La solution peut être avalée telle quelle sans dilution.

ZYRTEC, solution buvable en gouttes :

Les gouttes doivent être versées dans une cuillère ou diluées dans l'eau, puis avalées.

Adultes et adolescents de plus de 12 ans :

10 mg une fois par jour, soit 1 comprimé (ZYRTEC comprimé) ou 20 gouttes (ZYRTEC gouttes) ou 10 ml de solution buvable (2 cuillères-mesure pleines de ZYRTEC solution buvable en flacon) deux fois par jour.

Enfants de 6 à 12 ans :

5 mg deux fois par jour, soit un demi comprimé deux fois par jour (ZYRTEC comprimé) ou 10 gouttes deux fois par jour (ZYRTEC gouttes) ou 5 ml de solution buvable (une cuillère-mesure pleine de ZYRTEC solution buvable en flacon) deux fois par jour.

ZYRTEC comprimé n'est pas indiqué chez l'enfant de moins de 6 ans.

Insuffisance rénale modérée à sévère :

Chez les patients ayant une insuffisance rénale modérée à sévère, la dose sera réduite à 5 mg une fois par jour.

Si vous pensez que l'effet de ZYRTEC est trop faible ou trop fort, consultez votre médecin.

Durée du traitement :

La durée du traitement dépend du type, de la durée et de vos symptômes et est déterminée par votre médecin.

ZYRTEC® 10 mg, comprimé pelliculé sécable
ZYRTEC® 10 mg/ml, solution buvable en gouttes
ZYRTEC® 1 mg/ml, solution buvable en flacon

Dichlorhydrate de cétirizine



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de nécessité.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, contactez votre pharmacien.

63,90

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ZYRTEC ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZYRTEC ?
3. COMMENT PRENDRE ZYRTEC ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ZYRTEC ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ZYRTEC ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le dichlorhydrate de cétirizine est la substance active de ZYRTEC.

ZYRTEC est un médicament antihistaminique utilisé dans le traitement de l'allergie.

ZYRTEC solution buvable en gouttes et Zyrtec solution buvable en flacon sont indiqués chez l'adulte et l'enfant à partir de 2 ans :

ZYRTEC comprimé est indiqué chez l'adulte et l'enfant à partir de 6 ans :

- Pour le traitement des symptômes nasaux et oculaires de la rhinite allergique saisonnière ou perannuelle.
- Pour le traitement des symptômes de l'urticaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZYRTEC ?

Ne prenez jamais ZYRTEC

- Si vous avez une maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère avec une clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min).
- Si vous êtes allergique au dichlorhydrate de cétirizine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir rubrique 6 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES), à l'hydroxyzine ou aux dérivés de la pipérazine (substances actives apparentées contenues dans d'autres médicaments).

Faites attention avec ZYRTEC

Si vous avez une insuffisance rénale, demandez conseil à votre médecin ; si nécessaire, vous devrez prendre une dose inférieure. La posologie adaptée sera déterminée par votre médecin.

Si vous êtes épileptique ou si vous présentez des risques de convulsions, demandez conseil à votre médecin.

Il n'a pas été observé d'interaction spécifique entre la cétirizine utilisée aux doses recommandées et l'alcool (jusqu'à la concentration sanguine d'alcool de 0,5 pour mille (g/l) correspondant à un verre de vin).

Toutefois, aucune donnée n'est disponible lors de la prise de doses plus importantes de cétirizine et d'alcool. Par conséquent, comme avec tout autre antihistaminique, il est recommandé d'éviter la prise d'alcool avec ZYRTEC.

Si vous devez subir des tests pour le diagnostic de l'allergie (test cutané par exemple), il convient d'arrêter de prendre ce médicament au moins 3 jours avant leur réalisation car il peut en modifier les résultats. Demandez à votre médecin ce qu'il convient de faire avant la réalisation des tests pour le diagnostic de l'allergie.

Prise d'autres médicaments

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez pris récemment ou pourriez prendre tout autre médicament.

Aliments et boissons

L'absorption de la cétirizine contenue dans ZYRTEC n'est pas modifiée par la prise concomitante d'aliments.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ZYRTEC doit être évitée pendant la grossesse. L'utilisation par inadvertance en cours de grossesse ne devrait pas avoir d'effet délétère sur le fœtus. Cependant, ce médicament devra être administré uniquement si nécessaire et après avis médical.

La cétirizine passe dans le lait maternel. Par conséquent, vous ne devez pas prendre ZYRTEC pendant l'allaitement sans avoir demandé l'avis de votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Les études cliniques n'ont pas mis en évidence d'altération de la vigilance, du temps de réaction ou de la capacité à conduire après administration de ZYRTEC aux doses recommandées.

Cependant si vous êtes susceptible de conduire un véhicule, de faire des activités potentiellement dangereuses ou d'utiliser des machines, vous devez évaluer au préalable votre propre réaction au traitement par ZYRTEC.

Vous ne devez pas dépasser la dose recommandée.

Informations importantes concernant certains composants de ZYRTEC

ZYRTEC, comprimé contient du lactose, si votre médecin vous a informé(e) que vous aviez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

ZYRTEC, solution buvable en flacon contient du sorbitol. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

ZYRTEC, solution buvable en gouttes et ZYRTEC, solution buvable en flacon contiennent du parahydroxybenzoate de méthyle et du parahydroxybenzoate de propyle qui peuvent provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

3. COMMENT PRENDRE ZYRTEC ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en respectant la prescription de votre médecin ou les indications de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Zyrtec, comprimé :

Les comprimés doivent être avalés avec une boisson.

Le comprimé peut être divisé en 2 doses égales.

ZYRTEC, solution buvable en flacon :

La solution peut être avalée telle quelle sans dilution.

ZYRTEC, solution buvable en gouttes :

Les gouttes doivent être versées dans une cuillère ou diluées dans l'eau, puis avalées.

Adultes et adolescents de plus de 12 ans :

10 mg une fois par jour, soit 1 comprimé (ZYRTEC comprimé) ou 20 gouttes (ZYRTEC gouttes) ou 10 ml de solution buvable (2 cuillères-mesure pleines de ZYRTEC solution buvable en flacon) deux fois par jour.

Enfants de 6 à 12 ans :

5 mg deux fois par jour, soit un demi comprimé deux fois par jour (ZYRTEC comprimé) ou 10 gouttes deux fois par jour (ZYRTEC gouttes) ou 5 ml de solution buvable (une cuillère-mesure pleine de ZYRTEC solution buvable en flacon) deux fois par jour.

ZYRTEC comprimé n'est pas indiqué chez l'enfant de moins de 6 ans.

Insuffisance rénale modérée à sévère :

Chez les patients ayant une insuffisance rénale modérée à sévère, la dose sera réduite à 5 mg une fois par jour.

Si vous pensez que l'effet de ZYRTEC est trop faible ou trop fort, consultez votre médecin.

Durée du traitement :

La durée du traitement dépend du type, de la durée et de vos symptômes et est déterminée par votre médecin.

ZYRTEC® 10 mg, comprimé pelliculé sécable
ZYRTEC® 10 mg/ml, solution buvable en gouttes
ZYRTEC® 1 mg/ml, solution buvable en flacon

Dichlorhydrate de cétirizine



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de nécessité.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, consultez votre pharmacien.

63,20

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ZYRTEC ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYRTEC ?
3. COMMENT PRENDRE ZYRTEC ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ZYRTEC ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ZYRTEC ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le dichlorhydrate de cétirizine est la substance active de ZYRTEC.
ZYRTEC est un médicament antihistaminique utilisé dans le traitement de l'allergie.

ZYRTEC solution buvable en gouttes et Zyrtec solution buvable en flacon sont indiqués chez l'adulte et l'enfant à partir de 2 ans ;
ZYRTEC comprimé est indiqué chez l'adulte et l'enfant à partir de 6 ans :

- Pour le traitement des symptômes nasaux et oculaires de la rhinite allergique saisonnière ou perennuelle.
- Pour le traitement des symptômes de l'urticaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYRTEC ?

Ne prenez jamais ZYRTEC

- Si vous avez une maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère avec une clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min).
- Si vous êtes allergique au dichlorhydrate de cétirizine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir rubrique 6 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES), à l'hydroxyzine ou aux dérivés de la pipérazine (substances actives apparentées contenues dans d'autres médicaments).

Faites attention avec ZYRTEC

Si vous avez une insuffisance rénale, demandez conseil à votre médecin ; si nécessaire, vous devrez prendre une dose inférieure. La posologie adaptée sera déterminée par votre médecin.

Si vous êtes épileptique ou si vous présentez des risques de convulsions, demandez conseil à votre médecin.
Il n'a pas été observé d'interaction spécifique entre la cétirizine utilisée aux doses recommandées et l'alcool (jusqu'à la concentration sanguine d'alcool de 0,5 pour mille (g/l) correspondant à un verre de vin).

Toutefois, aucune donnée n'est disponible lors de la prise de doses plus importantes de cétirizine et d'alcool. Par conséquent, comme avec tout autre antihistaminique, il est recommandé d'éviter la prise d'alcool avec ZYRTEC.

Si vous devez subir des tests pour le diagnostic de l'allergie (test cutané par exemple), il convient d'arrêter de prendre ce médicament au moins 3 jours avant leur réalisation car il peut en modifier les résultats. Demandez à votre médecin ce qu'il convient de faire avant la réalisation des tests pour le diagnostic de l'allergie.

Prise d'autres médicaments

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez pris récemment ou pourriez prendre tout autre médicament.

Aliments et boissons

L'absorption de la cétirizine contenue dans ZYRTEC n'est pas modifiée par la prise concomitante d'aliments.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ZYRTEC doit être évitée pendant la grossesse. L'utilisation par inadvertance en cours de grossesse ne devrait pas avoir d'effet délétère sur le fœtus. Cependant, ce médicament devra être administré uniquement si nécessaire et après avis médical.

La cétirizine passe dans le lait maternel. Par conséquent, vous ne devez pas prendre ZYRTEC pendant l'allaitement sans avoir demandé l'avis de votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Les études cliniques n'ont pas mis en évidence d'altération de la vigilance, du temps de réaction ou de la capacité à conduire après administration de ZYRTEC aux doses recommandées.

Cependant si vous êtes susceptible de conduire un véhicule, de faire des activités potentiellement dangereuses ou d'utiliser des machines, vous devez évaluer au préalable votre propre réaction au traitement par ZYRTEC.

Vous ne devez pas dépasser la dose recommandée.

Informations importantes concernant certains composants de ZYRTEC

ZYRTEC, comprimé contient du lactose, si votre médecin vous a informé(e) que vous aviez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

ZYRTEC, solution buvable en flacon contient du sorbitol. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

ZYRTEC, solution buvable en gouttes et ZYRTEC, solution buvable en flacon contiennent du parahydroxybenzoate de méthyle et du parahydroxybenzoate de propyle qui peuvent provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

3. COMMENT PRENDRE ZYRTEC ?

VEillez à toujours prendre ce médicament en respectant la prescription de votre médecin ou les indications de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Zyrtec, comprimé :

Les comprimés doivent être avalés avec une boisson.

Le comprimé peut être divisé en 2 doses égales.

ZYRTEC, solution buvable en flacon :

La solution peut être avalée telle quelle sans dilution.

ZYRTEC, solution buvable en gouttes :

Les gouttes doivent être versées dans une cuillère ou diluées dans l'eau, puis avalées.

Adultes et adolescents de plus de 12 ans :

10 mg une fois par jour, soit 1 comprimé (ZYRTEC comprimé) ou 20 gouttes (ZYRTEC gouttes) ou 10 ml de solution buvable (2 cuillères-mesure pleines de ZYRTEC solution buvable en flacon).

Enfants de 6 à 12 ans :

5 mg deux fois par jour, soit un demi comprimé deux fois par jour (ZYRTEC comprimé) ou 10 gouttes deux fois par jour (ZYRTEC gouttes) ou 5 ml de solution buvable (une cuillère-mesure pleine de ZYRTEC solution buvable en flacon) deux fois par jour.

ZYRTEC comprimé n'est pas indiqué chez l'enfant de moins de 6 ans.

Insuffisance rénale modérée à sévère :

Chez les patients ayant une insuffisance rénale modérée à sévère, la dose sera réduite à 5 mg une fois par jour.

Si vous pensez que l'effet de ZYRTEC est trop faible ou trop fort, consultez votre médecin.

Durée du traitement :

La durée du traitement dépend du type, de la durée et de vos symptômes et est déterminée par votre médecin.

Spasfon® 80 mg

Comprimé enrobé

Phloroglucinol/Triméthylphlorogluci

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez toute autre question, si vous avez des doutes, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même si les symptômes identiques, cela pourrait être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION :

Phloroglucinol hydraté 80.000 mg
Quantité correspondant en Phloroglucinol anhydre ... 62,233 mg

Triméthylphloroglucinol 80 mg
Pour un comprimé enrobé

Les autres composants sont : lactose monohydraté, saccharose, acétate de polyvinyle, amidon de blé, acide stéarique, stéarate de magnésium, talc, gomme arabique, gélatine, dioxyde de titane (E 171), érythrosine (E127), cire de carnauba.

Excipients à effet notable : lactose, amidon de blé, saccharose

FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé enrobé Boîte de 30

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

(A: appareil digestif et métabolisme)
(G: système génito-urinaire)

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spastiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais Spasfon®, comprimé enrobé :

- en cas d'allergie à l'un des composants.
- en cas d'intolérance ou d'allergie au gluten, en raison de présence d'amidon de blé (gluten).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

Mises en garde

En raison de présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares). L'association de phloroglucinol avec des antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être évitée en raison de leur effet spasmogène.

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

I : MEDICAMENTS :
Tout autre médicament obtenu sans ordonnance ou à votre

27,50

T :
doit être envisagée nécessaire.
nent est déconseillée

meilleure médecine ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Spasfon® est un traitement symptomatique. La durée du traitement est variable en fonction de l'indication. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

Posologie

Chez l'adulte :

Prendre 2 comprimés par prise, trois fois par jour, en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 6 comprimés par 24 heures.

Les comprimés pourront prendre le relais d'un traitement d'attaque sous forme injectable, à la posologie maximale de 6 comprimés par 24 heures.

Utilisation chez les enfants

Cette présentation n'est pas adaptée aux enfants de moins de 6 ans.

Chez l'enfant de plus de 6 ans : 1 comprimé par prise, deux fois par jour, en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 2 comprimés par 24 heures.

Chez l'enfant de plus de 6 ans, il conviendra de s'assurer que les comprimés peuvent être avalés sinon une autre forme sera préférée.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, Spasfon®, comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- Manifestations cutanées et allergiques: éruption, rarement urticaire, exceptionnellement œdème de Quincke, hypotension artérielle, choc anaphylactique.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

Aucune condition particulière de conservation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Spasfon®, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Date de la notice : Janvier 2018

Spasfon® 80 mg

Comprimé enrobé

Phloroglucinol/Triméthylphlorogluci-

Veuillez lire attentivement l'intégralité notice avant de prendre ce médicament

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin.

Si vous avez toute autre question, si vous doutez, demandez plus d'informations à votre ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, m- cas de symptômes identiques, cela pourrait être nocif

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION :

Phloroglucinol hydraté 80.000 mg
Quantité correspondant en Phloroglucinol anhydre ... 62,233 mg

Triméthylphloroglucinol 80 mg

Pour un comprimé enrobé

Les autres composants sont : lactose monohydraté, saccharose, acétate de polyvinyle, amidon de blé, acide stéarique, stéarate de magnésium, talc, gomme arabique, gélatine, dioxyde de titane (E 171), érythrosine (E127), cire de carnauba.

Excipients à effet notoire : lactose, amidon de blé, saccharose

FORME ET PRESENTATION :

Comprimé enrobé Boîte de 30

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

(A.: appareil digestif et métabolisme)

(G: système génito-urinaire)

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spastiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais Spasfon®, comprimé enrobé :

- en cas d'allergie à l'un des composants.
- en cas d'intolérance ou d'allergie au gluten, en raison de présence d'amidon de blé (gluten).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Mises en garde

En raison de présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares). L'association de phloroglucinol avec des antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être évitée en raison de leur effet spasmogène.

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

I MEDICAMENTS :
cement un autre ament obtenu sans iédecin ou à votre

27,50

T :
e doit être envisagée nécessaire.
ment est décopiseillée

re médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Spasfon® est un traitement symptomatique. La durée du traitement est variable en fonction de l'indication. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

Posologie

Chez l'adulte :

Prendre 2 comprimés par prise, trois fois par jour, en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 6 comprimés par 24 heures.

Les comprimés pourront prendre le relais d'un traitement d'attaque sous forme injectable, à la posologie maximale de 6 comprimés par 24 heures.

Utilisation chez les enfants

Cette présentation n'est pas adaptée aux enfants de moins de 6 ans.

Chez l'enfant de plus de 6 ans : 1 comprimé par prise, deux fois par jour, en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 2 comprimés par 24 heures.

Chez l'enfant de plus de 6 ans, il conviendra de s'assurer que les comprimés peuvent être avalés sinon une autre forme sera préférée.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, Spasfon®, comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

Manifestations cutanéomuqueuses et allergiques: éruption, rarement urticaire, exceptionnellement œdème de Quincke, hypotension artérielle, choc anaphylactique.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

Aucune condition particulière de conservation

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Ne pas utiliser Spasfon®, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Date de la notice : Janvier 2018