


# SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

## SOINS DENTAIRES



Dents Traitées      Nature des soins      Coefficient


**Coefficient des travaux**

**Montant des soins**

**Début d'exécution**

**Fin d'exécution**

## O.D.F. Prothèses dentaires



Détermination du coefficient masticatoire

DROITE	12 13 14 15 16 17 18	GAUCHE	22 23 24 25 26 27 28
HAUT			
BAS	48 47 46 45 44 43 42 41 31	38 37 36 35 34 33	32

(Création, Remont, adjonction)  
Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession

**Coefficient des travaux**

**Montant des soins**

**Date du devis**

**Fin d'exécution**

**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

P 14 / 0054499

DATE DE DEPOT

/201

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Mle 1314

Nom & Prénom RAKI BRAHIM

Fonction Rehaté      Phones 0640281015

Mail

Signature de l'adhérent

MEDECIN      Prénom du patient AOUT GHORRA FATHIA

Adhérent  Conjoint  Enfant  Age 49 ans

Nature de la maladie

Date 20/08/19

Date 1ère visite

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

Nature des actes	Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires
------------------	---------------------	---------------------------------

c	1	100 DH
---	---	--------

PHARMACIE Date 20-08-19

Montant de la facture

Dr. Musaphia El Dajani Générale  
La Rabta - Casablanca - Maroc  
GSM 0661 3135

Signature

2389 MUPRAS

Prat. Dr. Musaphia El Dajani  
N° 31 Avenue R. El Oued  
Tel: 0528 272778 / Fax: 0528 7247

ANALYSES - RADIOGRAPHIES Date SEP. 2019

Désignation des Coefficients      Montant détaillé des Honoraires

ACCIDENT

AUXILIAIRES MEDICAUX Date

Nombre

AM PC IM IV Montant détaillé des Honoraires

Dr. EL MERNISSI Mustapha

دكتور المرنسي المصطفى

Médecine Générale

Bd. Bir Anzarane Pergola - Dcheïra  
Tél.: 062 20 31 35 - Agadir

الطب العام

شارع بشر انزاران - بركولة - الدشيرة  
الهاتف : 062 20 31 35 - أكادير

Nom du malade

Le

20/08/19

outgouma fatima T.A.

INP = 041058413

82,00x1

①

Noxcib 100 mg

15 x 2 } 10g

53,10

②

Relaxol



34,60x3

③

Amoacid 1g

1g / Sm 16

238,90

Pharmacie LA LIBERTE  
Elme, P  
Av. Bir Anzarane Pergola  
Tel. 05 28 27 27 78 / fax 05 28 27 24 78

Dr. Moustapha EL MERNISSI  
Médecine Générale  
La dshiera  
Tél. 062 20 31 35  
GSM 062 20 31 35

114

# رولاكسول® 500 ملг/2

باراسيتامول / ثيووكولشيكوزيد

أقراص

RELAXOL 500MG/2MG

CP B20 .

P.P.V : 53DH10

LOT  
10-19  
05A10S

118000 060833

6

ن، في، اخير الطبيب.  
ة العلاج الموصوفة في الفقرة 3 يجب عدم  
ة أكبر (أي 8 أقراص من رولاكسول) أو لمدة  
المواد المكونة في جسمك عندما تتناول

متعددة قد تتسبب في اضطرابات في بعض الحالات  
(عدد غير عادي من الصبغيات). وتمت البرهنة على ذلك خلال دراسات لدى  
الحيوانات والدراسات في المختبر لدى الإنسان، يعتبر هذا النوع من  
الاضطرابات الخطوية شامل خطر لظهور السرطان، لتغير الخصوصية الذكورية وقد  
يسشكل خطراً على المولود. يجب التحدث إلى الطبيب إذا كان لديك المزيد من  
الأسئلة.

سوف يخبرك الطبيب عن كافة التدابير المرتبطة بمنع الحمل الفعال  
والمخاطر المحتملة للحمل.  
تُحدد مدة العلاج في 7 أيام متتالية.  
قبل الشروع في العلاج بهذه الدواء، تتحقق من عدم تناول أدوية أخرى تحتوي  
على باراسيتامول.  
أخير الطبيب في حالة مرض في الكبد أو الكلى أو الاستهلاك المفرط للكحول.  
في حالة مشكلة في التغذية (سوء التغذية) أو فقدان الماء من الجسم، يجب  
استعمال رولاكسول، أقراص بكل حيطة.  
الأطفال والراهقون: لا تستعمل هذا الدواء لدى الأطفال أو المراهقين دون 16  
سنة لأسباب السلامة.

في حالة الشك، لا تتردد في استشارة الطبيب أو الصيدلي.  
تناول أو استعمال أدوية أخرى: أبلغ أثنك تتناول هذا الدواء إذا وصف لك  
الطبيب تحويل نسبة المضم البوريك في الدم أو نسبة السكر في الدم.  
قد يزيد رولاكسول من تسمم كلورامفينيكول.  
إذا كنت تتناول أو تتناول مؤخرًا أدوية أخرى، بما فيه دواء محصل عليه  
دون وصف طبي، أخير الطبيب أو الصيدلي.  
الحمل والرضاعة والخصوبة: لا تتناولى هذا الدواء، إذا كنت حاملاً، قد  
تصبحين حاملاً أو تعتقدين أنك حامل، إذا كنت من النساء في سن الإنجاب  
ولا تستعملين وسيلة لمنع الحمل.  
هذا الدواء قد يعرض المولود للخطر، لا تتناولى هذا الدواء إذا كنت تتعرضين،  
لأنه ينتقل إلى حليب الأم.  
قد يؤدي هذا الدواء إلى مشكلات الخصوبة الذكورية عبر التغير المحتل للخلايا  
المتغيرة (عدد غير عادي للصبغيات)، ويزن على ذلك خلال دراسات في  
المختبر (انظر الفقرة 2 "تحذيرات وإحتياطات")

قيادة السيارات واستعمال الألات

بيان الآثار الجانبية لدى سائقي السيارات واستعمال الآلات، حول إمكانية  
النعاس المرتبط باستعمال هذا الدواء، رغم أنها تظل نادرة، وتتفاقم هذه  
الظاهرة باستهلاك المشروبات الكحولية أو الأدوية المحتوية على الكحول.

3. يجب استعمال رولاكسول ١

يخصس هذا الدواء لمراقبة إضافية ستمكن من التعرف بسر  
المعلومات الجديدة المرتبطه بالسلامة. يمكن المساعدة فيها بالإبلاغ عن  
أى تأثير غير مرغوب فيه تم ملاحظته، انظر نهاية الفقرة 4 كيف يتم  
التصريح عن التأثيرات الثانية.

بروجي الإطلاع بانتهاء على هذه النشرة بأكملها قبل استعمال هذا الدواء.  
• احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى قراءتها من جديد.  
• إذا كانت لديك أي سؤال آخر، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب  
أو الصيدلي. • لقد تم وصف هذا الدواء لك بشكل شخصي، لا تقم بإعطائه  
لشخص آخر، حتى في حال وجود أعراض مشابهة، لأنك قد تسببضرر  
له. • إذا أصبح أحد التأثيرات غير المرغوب فيها خطراً أو لاحظت أي  
تأثير غير مرغوب فيه لم يكن في هذه النشرة، اخبار الطبيب أو الصيدلي.

١. ما هو رولاكسول وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟  
يوصى هذا الدواء في الحالات التالية:

• علاج أعراض الألم ذي أصل روماتيزي أو عضلي في طب الرضوح وطب النساء، علاج تكميلي للقصصات المولدة خلال، - الإضطرابات الفقرية  
الانتكساوية والاضطرابات الثابتة الفقرية، تيبس الرقبة، ألم الظهر، ألم أسفل  
الظهر، - إضطرابات رضوحية وعصبية (مع فرط التوتر الشنجي).  
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول رولاكسول؟  
لا تتناول أبداً رولاكسول في الحالات التالية: • إذا كانت لديك حساسية  
لثيووكولشيكوزيد، وأو باراسيتامول أو لأحد المكونات الأخرى للدواء  
(المذكورة في الفقرة 6). • إذا كنت حاملاً أو قد تصبحين حاملاً أو تعتقدين  
أنك حامل. • إذا كنت من النساء في سن الإنجاب لا تستعملين وسيلة لمنع  
الحمل. • إذا كنت تتعرضين، • قصور كبدكي خلوي أو مرض خطير في الكبد.  
لدى الأطفال دون 16 سنة.

في حالة الشك، من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي  
يجب الانتهاء عند استعمال رولاكسول.

احتياطات الاستعمال خاصة: يستعمل بمحيطة في حالة سوابق الصرع أو  
الاختلالات، يتطلب ظهور نوبة اختلالية توقف العلاج.  
في حالة جرعة مفرطة أو تناول جرعة جد مرتفعة عن طريق الخطأ، استشر  
الطبيب على الفور.

يحتوى هذا الدواء على باراسيتامول، كما تحتوى عليه أدوية أخرى، لا تجمع  
بينها حتى لا تتجاوز الجرعة اليومية المتصوّب بها (انظر فقرة "الجرعات")

تحذيرات خاصة: في حالة الإسهال، أخير الطبيب الذي قد يعيدي ضبط  
الجرعات.

# VOXCIB®

## Celecoxib

### COMPOSITION :

Chaque gélule VC

Chaque gélule VC

Excipients : Laur

Excipient à effet

CLASSE PHARM.

Ce médicament est

INDICATIONS :

Ce médicament est

Il calme la douleur e

par le corps, qui so

CONTRE - INDICA

Ce médicament NE

les patients souffr

de maladies cardiaques (telle qu'une angine de poitrine, un infarctus du myocarde ou une insuffisance cardiaque) de maladie

cérébro-vasculaire (antécédent d'accident vasculaire cérébral ou d'accident ischémique transitoire), de maladie inflammatoire de l'intestin, d'ulcère.

De même, il ne doit pas être administré en cas de Grossesse et Allaitement, d'insuffisance hépatique sévère, d'ulcère peptique évolutif ou saignement

gastro-intestinal.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### MISES EN GARDE :

Ce médicament DOIT ETRE PRIS SOUS SURVEILLANCE MEDICALE, PREVENIR VOTRE MEDECIN EN CAS DE :

- Femmes en âge de procréer, en l'absence de contraception efficace.

- Tension artérielle élevée.

- Insuffisance cardiaque.

- En cas d'accumulation de liquides dans le corps (œdème).

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN:

- En cas de maladies hépatiques ou rénales sévères

- En cas d'antécédents de réaction allergique telle que rash cutané, œdème, démangeaisons, sensation d'étouffement ou respiration sifflante après prise d'aspirine ou d'agents anti-inflammatoires non stéroïdiens.

- En cas de traitement à la warfarine ou tout autre anticoagulant

- Si vous présentez des facteurs de risque cardio-vasculaire, tels qu'une hypertension, un taux de cholestérol élevé, un diabète ou un tabagisme.

- VOXCIB doit être utilisé aux doses efficaces les plus faibles durant la période la plus courte.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE VOXCIB et plusieurs autres médicaments tels que :

- Warfarine.

- les antidépresseurs, les neuroleptiques, les antiarythmiques (sauf avis du médecin)

- Les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens.

SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

#### Grossesse :

Les femmes enceintes ou celles qui sont susceptibles de le devenir doivent en informer leur médecin.

Administration contre indiquée chez la femme enceinte (sauf avis du médecin).

#### Allaitement :

Administration contre indiquée chez la femme qui allaite.

### POSOLOGIE, MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

#### POSOLOGIE :

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

VOXCIB est réservé aux adultes et ne doit pas être prescrit aux enfants.

#### MODE D'EMPLOI :

VOXCIB peut être pris pendant ou en dehors des repas.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

#### VOIE D'ADMINISTRATION :

Voie orale.

Les gélules VOXCIB sont à avaler avec un grand verre d'eau.

#### CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSSAGE :

En cas de surdosage ou d'ingestion accidentelle, prévenir immédiatement un médecin ou les services des urgences d'un hôpital.

#### EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

- Les effets les plus fréquents : Hypertension, indigestion, douleur abdominale, diarrhée, nausées, sensation de vertige.

- Les effets les moins fréquents : Céphalées, en cas d'allergie prévenez votre médecin car il peut se produire des éruptions cutanées et des démangeaisons, infarctus du myocarde.

Des symptômes ressemblant à ceux de la grippe ont été observés : nez bouché, toux, dyspnée...

DANS TOUS LES CAS IL FAUT AVERTIR VOTRE MEDECIN

#### CONDUITE ET UTILISATION DES MACHINES :

Les patients qui présentent des étourdissements, des vertiges ou une somnolence lors de la prise de Celecoxib, devront s'absenter de conduire ou d'utiliser des machines.

#### PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :

A conserver dans le conditionnement primaire d'origine, à l'abri de l'humidité.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

#### PRESENTATIONS :

VOXCIB 100 : boîte de 20 gélules.

VOXCIB 200 : boîte de 10 gélules.

DUREE DE VALIDITE : 2 Ans

LISTE I

Fabriqué par le Laboratoire Pharmaceutique Novopharma

Z.I.I2 Tit Mellil - Casablanca

Sous licence the Jordanian pharmaceutical manufacturing Co.



**Amoxil** 500 mg et 1 g comprimés  
**Amoxil** 125 mg, 250 mg et 500 mg  
 flacon de 60 ml.

PPV : 34,60 DH  
 LOT : 585788.  
 PER : 08/20

PPV : 34,60 DH  
 LOT : 573199  
 PER : 04/20

## Amoxicilline

### Dénomination du médicament

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit à vous ou à votre enfant. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

### Qu'est-ce que cette notice ?

1. Qu'est-ce que AMOXIL et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AMOXIL ?
3. Comment prendre AMOXIL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver AMOXIL ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE AMOXIL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### Classe pharmacothérapeutique

##### Qu'est-ce que AMOXIL ?

AMOXIL est un antibiotique. Le principe actif est l'amoxicilline. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines ».

##### Dans quels cas AMOXIL est-il utilisé ?

AMOXIL est utilisé pour traiter des infections causées par des bactéries dans différentes parties du corps.

AMOXIL peut également être utilisé en association à d'autres médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AMOXIL ?

#### Ne prenez jamais AMOXIL :

- Si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
  - Si vous avez déjà présenté une réaction allergique à un antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou de la gorge.
- Ne prenez pas AMOXIL si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse (fièvre, maux de gorge, ganglions enflés et fatigue extrême)
- avez des problèmes rénaux
- N'urinez pas régulièrement

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

#### Tests sanguins et urinaires

Si vous devez effectuer :

- Des analyses d'urine (dosage du glucose) ou des analyses de sang pour explorer le fonctionnement de votre foie,
- Un dosage d'œstrol (utilisé pendant la grossesse pour vérifier que le bébé se développe normalement).

Informez votre médecin ou votre pharmacien que vous prenez AMOXIL. En effet, AMOXIL peut influer sur les résultats de ces tests.

#### Enfants

Sans sujet.

#### Autres médicaments et AMOXIL :

Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

- Si vous prenez de l'allopurinol (utilisé dans le traitement de la goutte) avec AMOXIL, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.
- Si vous prenez du probénécide (utilisé dans le traitement de la goutte), votre médecin peut décider d'adapter votre dose d'AMOXIL.
- Si vous prenez des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine), vous pourrez avoir besoin d'effectuer des analyses sanguines supplémentaires.

#### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### Sportifs

Sans objet.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

AMOXIL peut provoquer des effets indésirables (comme des réactions allergiques, des vertiges et des convulsions) susceptibles de réduire votre capacité à conduire. Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines à moins que vous vous sentiez bien.

#### AMOXIL comprimé dispersible contient de l'aspartam

L'aspartam (E951) est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive pour les patients ayant une maladie appelée « phénylcétoneurie ».

#### AMOXIL poudre pour suspension buvable contient :

- L'aspartam (E951) est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive pour les patients ayant une maladie appelée « phénylcétoneurie ».
- Le maltodextrine est absorbée sous forme de glucoses. Si votre médecin vous a informé que vous avez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.
- En raison de la présence de benzoate de sodium (E221), ce médicament peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et des muqueuses et peut accroître le risque de jaunisse chez le nouveau-né.

### 3. COMMENT PRENDRE AMOXIL ?

VEUILLEZ À TOUJOURS PRENDRE CE MÉDICAMENT EN SUivant EXACTEMENT LES INDICATIONS DE VOTRE MÉDICIN OU PHARMACIEN. VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE MÉDICIN OU PHARMACIEN EN CAS DE DOUBTE.

- FAIRE DISSOUDRE COMPLÈTEMENT CHAQUE COMPRIMÉ DANS UN VERRE D'EAU ET BIEN REMUER LE MÉLANGE JUSQU'À CE QU'IL SOIT HOMOGÈNE. AVALER IMMÉDIATEMENT LE MÉLANGE ;
- AGITER BIEN LE FLACON AVANT CHAQUE UTILISATION ET UTILISER LA CUILLÈRE FOURNIE AVEC LE FLACON ;
- RÉPÉTEZ LES PRISES DE MANIÈRE RÉGULIÈRE AU COURS DE LA JOURNÉE ; ELLES DOIVENT ÊTRE ESPACÉES D'AU MOINS 4 HEURES.

#### Posologie habituelle :

##### Enfants pesant moins de 40 kg

Toutes les posologies sont déterminées en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.

- Votre médecin vous indiquera la quantité d'AMOXIL que vous devez administrer à votre bébé ou votre enfant.
- La posologie habituelle est de 40 mg à 90 mg par kilogramme de poids corporel et par jour, à administrer en deux ou trois prises.
- La dose maximale recommandée est de 100 mg par kilogramme de poids corporel et par jour.

##### Adultes, patients âgés et enfants pesant 40 kg ou plus

La forme suspension n'est pas adaptée aux adultes et enfants de plus de 40 Kg. La posologie habituelle d'AMOXIL est de 250 mg à 500 mg trois fois par jour ou 750 mg à 1 g toutes les 12h, selon la sévérité et le type d'infection.

- Infections sévères : 750 mg à 1 g trois fois par jour.
- Infection des voies urinaires : 3 g deux fois par jour pendant un jour.
- Maladie de Lyme (Infection transmise par des parasites appelés tiques) : érythème migrant isolé (phase précoce - éruption cutanée circulaire rouge ou rose) : 4 g par jour, manifestations systémiques (phase tardive - avec des symptômes plus graves ou quand la maladie est étendue à tout le corps) : jusqu'à 6 g par jour.
- Ulcère de l'estomac : 750 mg ou 1 g deux fois par jour pendant 7 jours avec d'autres antibiotiques et médicamenteux destinés à traiter les ulcères de l'estomac.
- Pour prévenir les infections cardiaques en cas de chirurgie. La posologie varie selon le type de chirurgie. D'autres médicaments peuvent également être administrés simultanément. Votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère pourra vous donner plus de détails.



**Amoxil** 500mg et 1 g comprimés dispersibles, boîte de 12 et 24.  
**Amoxil** 125 mg, 250mg et 500mg, poudre pour suspension buvable.

**Amoxil** 125 mg, 250mg et 500mg, poudre pour suspension buvable

من الماء وحرك الخليط  
AMOXIL  
12 comprimés

PPV: 34,60 BH  
LOT: 585788  
PEL: 08/20

**AMOXIL**  
12 comprimés

6 1180

édicament car

- Si vous prenez  
être moins efficace
- Si vous présentez  
psoriasis sévère et  
indésirables

**AMOXIL avec**

Sans objet.

des aliments

antibiotique peut provoquer des effets secondaires.

isés dans le traiter une augmentation des tissus

ment de cancer et l'atténuation des effets

du

- Si vous prenez d'autres antihistaminiques (tels que les *macracyclines*) AMOXIL peut être moins efficace.
- Si vous prenez du méthotrexate (utilisé dans le traitement du cancer et du psoriasis sévère) AMOXIL peut provoquer une augmentation des effets indésirables.

**Sans objet.**  
**Conduite de véhicules et utilisation de machines**  
AMOXIL peut provoquer des effets indésirables (comme des réactions allergiques,

**AMOXIL** comprimé dispersible contient de l'aspartame. L'aspartan (E951) est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive pour des personnes en cours de traitement susceptibles d'un trouble nommé *واري اکسپریس*. Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machineries à courant électrique lorsqu'en cours de traitement susceptibles d'un trouble nommé *واري اکسپریس*.

- L'aspartam (E 951) est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive pour les patients ayant une maladie appelée « phénylcétonurie ».
- Le maltodextrine est absorbé sous forme de glucose. Si votre médecin vous a informé au sujet de la consommation de produits sucrés, il convient de prendre des précautions dans la mesure du possible.

- En raison de la présence de benzate de sodium (E221), ce médicament peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et des muqueuses et peut accroître le risque de jaunisse chez le nouveau-né.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

• faire dissoudre complètement chaque comprimé dans un verre d'eau et bien

- Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée : elles doivent mélanger ; agiter bien le flacon avant chaque utilisation et utilisez la cuillère fournie avec le flacon ;

**Poseologie habituelle :**  
**Enfants pesant moins de 40 kg**  
Toutes les poseologies sont déterminées en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.

- à votre bébé ou votre enfant.
- La posologie habituelle est de 40 mg à 90 mg par kilogramme de poids corporel et par jour, à administrer en deux ou trois prises.
- La dose maximale recommandée est de 100 mg par kilogramme de poids

**Adultes, patients âgés et enfants pesant 40 kg ou plus**  
La forme suspension n'est pas adaptée aux adultes et enfants de plus de 40 Kg.  
La posologie habituelle d'AMOXICIL est de 250 mg à 500 mg trois fois par jour au  
750 mg à 19 heures les 12h, selon la sévérité et le type d'infection.

- **Infection des voies urinaires** : 3 g deux fois par jour pendant un jour.
- **Maladie de Lyme (infection transmise par des parasites appelés tiques)** :
  - érythème migrateur isolé (phase primaire - éruption cutanée circulaire rouge ou rose)
  - 4 g par jour, manifestations systémiques (phase tardive - avec des symptômes

- **Ulcère de l'estomac :** 750 mg ou 1 g deux fois par jour pendant 7 jours avec d'autres antibiotiques et médicaments destinés aux ulcères de l'estomac.
- **Pour prévenir les infections cardiaques en cas de chirurgie.** La posologie varie selon le type de chirurgie. D'autres médicaments peuvent également être

• Si vous prenez des médicaments (tels que la warfarine), vous sanguinaires supplémentaires.