



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

P 14 / 0055657

DATE DE DEPOT

/ / 201

A REMPLIR PAR L'ADHERENT		Mle <i>B 14</i>	Signature de l'adherent
Nom & Prénom <i>Roua Boud</i>			
Fonction <i>Secrétaire</i>	Phones <i>0640780015</i>		
Mail			

MEDECIN	Prénom du patient <i>Boud SAADIA</i>		
Adhérent <input type="checkbox"/>	Conjoint <input checked="" type="checkbox"/>	Enfant <input type="checkbox"/>	Age
Nature de la maladie			Date
			Date 1ère visite

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances		
<i>HTA</i>		
Nature des actes	Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires
<i>e</i>	<i>1</i>	<i>100DH</i>

PHARMACIE	Date <i>1 / 09 / 2019</i>
Montant de la facture	
<i>253,40</i>	

Pharmacie LA LIBERTE
Mme. Boud
Av. Dir Azoua
06 27 24 78

Dr. Mustapha EL KHANISSI
Médecin Généraliste
GSM : 06 62 20 31 35

ANALYSES - RADIOGRAPHIES		Date
Désignation des Coefficients	Montant détaillé des Honoraires	
MUPRAS		

AUXILIAIRES MEDICAUX				Date <i>1. SEP. 2019</i>
Nombre				Montant détaillé des Honoraires
AM	PC	IM	IV	

ACCUEIL

CACHET

Dr. EL MERNISSI Mustapha

دكتور المرنيسي المصطفى

Médecine Générale

الطب العام

Bd. Bir Anzarane Pergola - Dcheïra

شارع بئر أنزران - بركولة - الدشيرة

Tél.: 062 20 31 35 - Agadir

الهاتف: 062 20 31 35 - أكادير

Le 01/09/19

Nom du malade Boual Sanaï A T°c

INP - 041058413



① clonidex 20 mg
34,624

15/mati
3mg

6000

② Prozealan



③ 1 mg x 3
55,00
253,40
L'ap 22



Dr. Mustapha EL MERNISSI
Médecine Générale
Bir Pergola - Dcheïra
GSM: 06 62 20 31 35

BIORELAXAN®

CRÈME MYORELAXANTE

Pathologies : entorses, élongations, claquages, ecchymoses, oedèmes, les douleurs dorsolombaires de types rhumatismales, les contacts avec les yeux et les muqueuses. Ne pas appliquer sur l'enfant de moins de 30 mois. **Effets indésirables ou**

Mode d'administration : BIORELAXAN s'applique

à trois semaines.

Agar, Paraffinum Liquidum, Salicylate, Isopropylmyristate, Glyceryl Stearate, Dimethicone Petrolatum, Cetyl Steraryl Alcohol, Glycerin, Ceteareth 6 Stearyl Alcohol, Ceteareth 25, Stearic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Rosmarinus Officinalis Cineoliferum Essential Oil, Eucalyptus Globulus Essential Oil, Mentha Piperita Essential Oil, Ginger Zingiber Officinale Root Essential Oil ...

Propriétés :

BIORELAXAN est recommandé comme crème de massage en cas des pathologies douloureuses ostéoarticulaires, des douleurs dorsolombaires de type rhumatismales, les rhumatismes inflammatoires, les claquages, ecchymoses, tendinites, synovites...

Mode d'emploi :

Appliquer BIORELAXAN par massages doux. Il est conseillé de procéder à trois applications par jour pendant une à trois semaines.

Précaution d'emploi :

Eviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.
Ne pas appliquer sur les plaies.
Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 30 mois.
Se laver les mains après application.

Produit des laboratoires PMP Biopharmed
73-74, Rue n°2, Zone Industrielle My Rachid Casablanca.
www.pmpbiopharmed.com

AMOXIL

Amoxil

500mg et 1 g comprimés dispersibles, boîte de 12 et 24,

flacon

mettre préalablement dans un demi verre d'eau avant ingestion

PPV : 55,00 DH

AMOXIL 1g 12 comprimés dispersibles



pour suspension buvable,

prendre ce médicament car vous.

la relire, médecin ou votre pharmacien. votre enfant. Ne le donnez pas à me si les signes de leur maladie

parlez-en à votre médecin ou et indésirable qui ne serait pas

il utilisé ? de prendre AMOXIL ?

EST-IL UTILISE ?

ordon. qui-ci appartient

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

PPV: 55,00 DH
LOT: 607163
PER: 07/20

12

gsk

- Si vous prenez d'autres antibiotiques (tels que les tétracyclines) AMOXIL peut être moins efficace.
- Si vous prenez du méthotrexate (utilisé dans le traitement de cancer et du psoriasis sévère) AMOXIL peut provoquer une augmentation des effets indésirables.

AMOXIL avec des aliments et boissons :

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

AMOXIL peut provoquer des effets indésirables (comme des réactions allergiques, des vertiges et des convulsions) susceptibles de réduire votre capacité à conduire. Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines à moins que vous vous sentiez bien.

AMOXIL comprimé dispersible contient de l'aspartame

L'aspartame (E951) est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive pour les patients ayant une maladie appelée « phénylcétonurie ».

AMOXIL poudre pour suspension buvable contient :

- L'aspartame (E951) est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive pour les patients ayant une maladie appelée « phénylcétonurie ».
- Le maltodextrine est absorbée sous forme de glucose. Si votre médecin vous a informé que vous aviez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

En raison de la présence de benzoate de sodium (E221), ce médicament peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et des muqueuses et peut accroître le risque de jaunisse chez le nouveau-né.

3. COMMENT PRENDRE AMOXIL ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Faire dissoudre complètement chaque comprimé dans un verre d'eau et bien remuer le mélange jusqu'à ce qu'il soit homogène. Avaler immédiatement le mélange ;
- Agiter bien le flacon avant chaque utilisation et utiliser la cuillère fournie avec le flacon ;
- Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être espacées d'au moins 4 heures.

Posologie habituelle :

Enfants pesant moins de 40 kg

Toutes les posologies sont déterminées en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.

- Votre médecin vous indiquera la quantité d'AMOXIL que vous devez administrer à votre bébé ou votre enfant.
- La posologie habituelle est de 40 mg à 90 mg par kilogramme de poids corporel et par jour, à administrer en deux ou trois prises.
- La dose maximale recommandée est de 100 mg par kilogramme de poids corporel et par jour.

Adultes, patients âgés et enfants pesant 40 kg ou plus

La forme suspension n'est pas adaptée aux adultes et enfants de plus de 40 Kg. La posologie habituelle d'AMOXIL est de 250 mg à 500 mg trois fois par jour ou 750 mg à 1 g toutes les 12h, selon la sévérité et le type d'infection.

- **Infections sévères :** 750 mg à 1 g trois fois par jour.
- **Infection des voies urinaires :** 3 g deux fois par jour pendant un jour.
- **Maladie de Lyme (infection transmise par des parasites appelés tiques) :** érythème migrant isolé (phase précoce - éruption cutanée circulaire rouge ou rose) : 4 g par jour, manifestations systémiques (phase tardive - avec des symptômes plus graves ou quand la maladie est étendue à tout le corps) : jusqu'à 6 g par jour.
- **Ulçère de l'estomac :** 750 mg ou 1 g deux fois par jour pendant 7 jours avec d'autres antibiotiques et médicaments destinés à traiter les ulcères de l'estomac.
- **Pour prévenir les infections cardiaques en cas de chirurgie.** La posologie varie selon le type de chirurgie. D'autres médicaments peuvent également être administrés simultanément. Votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère pourra vous donner plus de détails.

- souffrance
- et fatigue extrême)
- avez des problèmes rénaux
- N'urinez pas régulièrement

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

Tests sanguins et urinaires

Si vous devez effectuer :
• Des analyses d'urine (dosage du glucose) ou des analyses de sang pour explorer le fonctionnement de votre foie,

• Un dosage d'astriol (utilisé pendant la grossesse pour vérifier que le bébé se développe normalement).

Informez votre médecin ou votre pharmacien que vous prenez AMOXIL. En effet, AMOXIL peut influencer sur les résultats de ces tests.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et AMOXIL :

Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

- Si vous prenez de l'allopurinol (utilisé dans le traitement de la goutte) avec AMOXIL, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.
- Si vous prenez du probénécide (utilisé dans le traitement de la goutte), votre médecin peut décider d'adapter votre dose d'AMOXIL.
- Si vous prenez des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine), vous pourriez avoir besoin d'effectuer des analyses sanguines supplémentaires.

Lasilix® 40 mg
Lasilix® 20 mg/2 ml

Furosémide

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice.
 Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
 Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
 Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
 Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

LOT : 8MA062
 PER : 01/2022

Lasilix 40mg
 20 Cp séc
 P.P.V : 34DH60



SANOFI

لازليكس 40 ملغ

LOT : 8MA065
 PER : 04/2022

Lasilix 40mg
 20 Cp séc
 P.P.V : 34DH60

فوروسيميد
 عن
 20

Lasilix® 40 mg
Lasilix® 20 mg/2 m.

LOT : 8MA067
 PER : 06/2022

Lasilix 40mg
 20 Cp séc
 P.P.V : 34DH60



Lasilix® 40 mg
Lasilix® 20 mg/2

LOT : 8MA069
 PER : 06/2022

Lasilix 40mg
 20 Cp séc
 P.P.V : 34DH60



Furosémide

SANOFI

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
 Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
 Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
 Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
 Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

LASILIX 40 mg comprimés :

Furosémide 40 mg/comprimé.

Excipients : amidon de maïs, lactose, silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium.

LASILIX 20 mg/2ml :