



**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

P 14 / 0055656

Couier

DATE DE DEPOT

/201

A REMPLIR PAR L'ADHERENT		Mle 1314	Signature de l'adherent
Nom & Prénom	Raki Brahim		
Fonction	Rehate	Phones 06.65.78.01.15	
Mail			

MEDECIN	Prénom du patient RAKI Brahim		
Adhérent <input checked="" type="checkbox"/>	Conjoint <input type="checkbox"/>	Enfant <input type="checkbox"/>	Age .....
Nature de la maladie		Date 1ère visite	
Diabète + Furoncle.			

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances			
Nature des actes		Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires
C		1	100 DT

Dr. Mustapha EL MESSI  
Spécialiste et  
Medecin de Cabinet  
La Perle, 1000  
GSM: 05 28 21 27 76

PHARMACIE	Date 5108119	Pharmacie et Mme. Boujemaa Tél. 05 28 21 27 76 / fax: 05 28 21 27 78
Montant de la facture	153,70	

ANALYSES - RADIOGRAPHIES		Date	CACHET
Désignation des Coefficients	Montant détaillé des Honoraires T. SEP. 2019		

AUXILIAIRES MEDICAUX		Date	CACHET
Nombre		Montant détaillé des Honoraires	
AM	PC	IM	IV

Dr. EL MERNISSI Mustapha

Médecine Générale

Bd. Bir Anzarane Pergola - Dcheïra

Tél.: 062 20 31 35 - Agadir

الدكتور المرنسي المصطفى

الطب العام

شارع بشر أنزاران، بركلولة - الدشيرة

الهاتف: 062 20 31 35 - أكادير

Nom du malade

Raki Brahma

T° C

Le

05/08/14

TNT - 041058413  
54,00 X 5

①

Ramipril 5 mg



116,40

1g x 2

4 mois

②

Alokan



39,80

1g + 3(3)

③

Heparat



27,50

1g x 2

④

Diclofenac



153,70

5g + 2g



An Bir Al  
Marrakech  
Tel. 05 28 27 44

Pharmacie  
Marrakech  
Av. Bir Anzarane  
Tel. 05 28 27 77 65

La Pharmacie  
de la Pergola  
Av. Bir Anzarane  
Tel. 05 28 27 77 24 78

# Ramipril Win®

5 mg 10 mg

Ra

54,00

Con

Veu  
mén

- Ga
- Si
- votre
- Ce
- d'autre
- Si l'u
- mentionne



1. Qu'est-ce que Ramipril Win, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Ramipril Win, comprimé sécable ?
3. Comment prendre Ramipril Win, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Ramipril Win, comprimé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE RAMIPRIL WIN, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique

Ramipril Win, comprimé sécable contient un médicament appelé ramipril. Celui-ci fait partie d'un groupe de médicaments appelés IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion).

Ramipril Win, comprimé sécable agit en :

- Diminuant la production par votre organisme de substances susceptibles d'élever votre pression artérielle,
- Faisant se relâcher et se dilater vos vaisseaux sanguins,
- Facilitant à votre cœur le pompage du sang à travers l'organisme.

### Indications thérapeutiques

Ramipril Win, comprimé sécable peut être utilisé :

- Pour traiter une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour réduire le risque d'avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.
- Pour réduire le risque ou retarder l'aggravation de problèmes rénaux (que vous soyez ou non diabétique).
- Pour traiter votre cœur lorsqu'il ne peut pas pomper une quantité suffisante de sang dans le reste de votre organisme (insuffisance cardiaque).
- En traitement à la suite d'une crise cardiaque (infarctus du myocarde) compliquée d'insuffisance cardiaque.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE RAMIPRIL WIN, comprimé sécable ?

### Contre-indications

**Ne prenez jamais Ramipril Win, comprimé sécable :**

- Si vous présentez une allergie (hypersensibilité) au ramipril, à tout autre IEC, ou à l'un des autres composants contenus dans Ramipril Win, comprimé sécable listés à la rubrique Informations supplémentaires.
- Les signes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée (rash), des problèmes de déglutition ou de respiration, un gonflement de vos lèvres, de votre visage, de votre gorge ou de votre langue.
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave appelée « angioédème ». Les signes comparent des démangeaisons, une urticaire, des marques rouges sur les mains, les pieds et la gorge, un gonflement de la gorge et de la langue, un gonflement autour des yeux et des lèvres, des difficultés à respirer et à avaler.
- Si vous subissez une dialyse ou tout autre type de filtration sanguine. En fonction de la machine utilisée, Ramipril Win, comprimé sécable pourrait ne pas vous convenir.
- Si vous avez des problèmes rénaux du fait de la réduction de l'apport sanguin à votre rein (sténose de l'artère rénale).
- Si vous êtes enceinte depuis plus de 3 mois. Il est également préférable d'éviter de prendre

Ramipril Win, co  
allaitemen

• Si votre pression  
prenez pas Ra  
terne. Si vous  
primé sécable.  
cautions d'e  
ez auprès de  
vous souffrez d  
vous avez per  
la diarrhée, s  
étiques depuis  
vous allez suiv  
sensibilisatio  
Si vous allez r  
Intervention chirur  
traitement par Ra  
médecin.

• Si votre taux sang  
• Si vous souffrez d  
érythémateux systé  
• Vous devez inform  
Ramipril est décon  
plus de 3 mois, ca  
ce stade de la gros

### Enfant

L'utilisation de ram  
car la tolérance et l  
Si l'un ou l'autre de  
à votre médecin av

### Interactions avec

### Prise d'autres m

Veuillez informer v  
d'autres médicam  
ordonnance (en in  
certains autres mé  
sur Ramipril Win, o  
Veuillez informer v  
peuvent rendre Ra

• Les médicaments  
anti-inflammatoires  
• Les médicaments  
d'une insuffisance  
ou l'adrénaline. Vo  
Veuillez informer v  
peuvent augmenter  
Ramipril Win, com

• Les médicaments  
anti-inflammatoires  
• Les médicaments  
que la spironolacto  
pour fluidifier le sa

• Les corticoïdes d  
• L'allopurinol (uti  
Le procaïnamide  
Veuillez informer v  
pourraient être affe  
• Les médicaments  
pourrait abaisser la  
glycémie lorsque v

# Ramipril Win®

5 mg 10 mg

Ra

54,00

Con

Veu  
mén

- Ga
- Si
- votre
- Ce
- d'autre
- Si l'u
- mentionne



1. Qu'est-ce que Ramipril Win, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Ramipril Win, comprimé sécable ?
3. Comment prendre Ramipril Win, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Ramipril Win, comprimé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE RAMIPRIL WIN, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique

Ramipril Win, comprimé sécable contient un médicament appelé ramipril. Celui-ci fait partie d'un groupe de médicaments appelés IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion).

Ramipril Win, comprimé sécable agit en :

- Diminuant la production par votre organisme de substances susceptibles d'élever votre pression artérielle,
- Faisant se relâcher et se dilater vos vaisseaux sanguins,
- Facilitant à votre cœur le pompage du sang à travers l'organisme.

### Indications thérapeutiques

Ramipril Win, comprimé sécable peut être utilisé :

- Pour traiter une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour réduire le risque d'avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.
- Pour réduire le risque ou retarder l'aggravation de problèmes rénaux (que vous soyez ou non diabétique).
- Pour traiter votre cœur lorsqu'il ne peut pas pomper une quantité suffisante de sang dans le reste de votre organisme (insuffisance cardiaque).
- En traitement à la suite d'une crise cardiaque (infarctus du myocarde) compliquée d'insuffisance cardiaque.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE RAMIPRIL WIN, comprimé sécable ?

### Contre-indications

**Ne prenez jamais Ramipril Win, comprimé sécable :**

- Si vous présentez une allergie (hypersensibilité) au ramipril, à tout autre IEC, ou à l'un des autres composants contenus dans Ramipril Win, comprimé sécable listés à la rubrique Informations supplémentaires.
- Les signes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée (rash), des problèmes de déglutition ou de respiration, un gonflement de vos lèvres, de votre visage, de votre gorge ou de votre langue.
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave appelée « angioédème ». Les signes comparent des démangeaisons, une urticaire, des marques rouges sur les mains, les pieds et la gorge, un gonflement de la gorge et de la langue, un gonflement autour des yeux et des lèvres, des difficultés à respirer et à avaler.
- Si vous subissez une dialyse ou tout autre type de filtration sanguine. En fonction de la machine utilisée, Ramipril Win, comprimé sécable pourrait ne pas vous convenir.
- Si vous avez des problèmes rénaux du fait de la réduction de l'apport sanguin à votre rein (sténose de l'artère rénale).
- Si vous êtes enceinte depuis plus de 3 mois. Il est également préférable d'éviter de prendre

Ramipril Win, co  
allaitemen

• Si votre pression  
prenez pas Ra  
terne. Si vous  
primé sécable.  
cautions d'e  
ez auprès de  
vous souffrez d  
vous avez per  
la diarrhée, s  
étiques depuis  
vous allez suiv  
sensibilisatio  
Si vous allez r  
Intervention chirur  
traitement par Ra  
médecin.

• Si votre taux sang  
• Si vous souffrez d  
érythémateux systé  
• Vous devez inform  
Ramipril est décon  
plus de 3 mois, ca  
ce stade de la gros

### Enfant

L'utilisation de ram  
car la tolérance et l  
Si l'un ou l'autre de  
à votre médecin av

### Interactions avec Prise d'autres m

Veuillez informer v  
d'autres médicam  
ordonnance (en in  
certains autres mé  
sur Ramipril Win, o  
Veuillez informer v  
peuvent rendre Ra

• Les médicaments  
anti-inflammatoires  
• Les médicaments  
d'une insuffisance  
ou l'adrénaline. Vo  
Veuillez informer v  
peuvent augmenter  
Ramipril Win, com

• Les médicaments  
anti-inflammatoires

• Les médicaments  
que la spironolacto  
pour fluidifier le sa

• Les corticoïdes o

• L'allopurinol (uti

Le procaïnamide  
Veuillez informer v  
pourraient être affe

• Les médicaments  
pourrait abaisser la  
glycémie lorsque v

# Ramipril Win®

5 mg 10 mg

Ra

54,00

Con

Veu  
mè

- Ga
- Si
- votre
- Ce
- d'autre
- Si l'u
- mentionne



1. Qu'est-ce que Ramipril Win, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Ramipril Win, comprimé sécable ?
3. Comment prendre Ramipril Win, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Ramipril Win, comprimé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE RAMIPRIL WIN, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique

Ramipril Win, comprimé sécable contient un médicament appelé ramipril. Celui-ci fait partie d'un groupe de médicaments appelés IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion).

Ramipril Win, comprimé sécable agit en :

- Diminuant la production par votre organisme de substances susceptibles d'élever votre pression artérielle,
- Faisant se relâcher et se dilater vos vaisseaux sanguins,
- Facilitant à votre cœur le pompage du sang à travers l'organisme.

### Indications thérapeutiques

Ramipril Win, comprimé sécable peut être utilisé :

- Pour traiter une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour réduire le risque d'avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.
- Pour réduire le risque ou retarder l'aggravation de problèmes rénaux (que vous soyez ou non diabétique).
- Pour traiter votre cœur lorsqu'il ne peut pas pomper une quantité suffisante de sang dans le reste de votre organisme (insuffisance cardiaque).
- En traitement à la suite d'une crise cardiaque (infarctus du myocarde) compliquée d'insuffisance cardiaque.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE RAMIPRIL WIN, comprimé sécable ?

### Contre-indications

**Ne prenez jamais Ramipril Win, comprimé sécable :**

- Si vous présentez une allergie (hypersensibilité) au ramipril, à tout autre IEC, ou à l'un des autres composants contenus dans Ramipril Win, comprimé sécable listés à la rubrique Informations supplémentaires.
- Les signes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée (rash), des problèmes de déglutition ou de respiration, un gonflement de vos lèvres, de votre visage, de votre gorge ou de votre langue.
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave appelée « angioédème ». Les signes comparent des démangeaisons, une urticaire, des marques rouges sur les mains, les pieds et la gorge, un gonflement de la gorge et de la langue, un gonflement autour des yeux et des lèvres, des difficultés à respirer et à avaler.
- Si vous subissez une dialyse ou tout autre type de filtration sanguine. En fonction de la machine utilisée, Ramipril Win, comprimé sécable pourrait ne pas vous convenir.
- Si vous avez des problèmes rénaux du fait de la réduction de l'apport sanguin à votre rein (sténose de l'artère rénale).
- Si vous êtes enceinte depuis plus de 3 mois. Il est également préférable d'éviter de prendre

Ramipril Win, co  
allaitemen

• Si votre pression  
prenez pas Ra  
terne. Si vous  
primé sécable.  
cautions d'e  
ez auprès de  
vous souffrez d  
vous avez per  
la diarrhée, s  
étiques depuis  
vous allez suiv  
sensibilisatio  
Si vous allez r  
Intervention chirur  
traitement par Ra  
médecin.

• Si votre taux sang  
• Si vous souffrez d  
érythémateux systé  
• Vous devez inform  
Ramipril est décon  
plus de 3 mois, ca  
ce stade de la gros

### Enfant

L'utilisation de ram  
car la tolérance et l  
Si l'un ou l'autre de  
à votre médecin av

### Interactions avec

### Prise d'autres m

Veuillez informer v  
d'autres médicam  
ordonnance (en in  
certains autres mé  
sur Ramipril Win, o  
Veuillez informer v  
peuvent rendre Ra

• Les médicaments  
anti-inflammatoires  
• Les médicaments  
d'une insuffisance  
ou l'adrénaline. Vo  
Veuillez informer v  
peuvent augmenter  
Ramipril Win, com

• Les médicaments  
anti-inflammatoires  
• Les médicaments

• Les médicaments  
• Les diurétiques te  
• Les médicaments

que la spironolacto  
pour fluidifier le sa

• Les corticoïdes d  
• L'allopurinol (uti

Le procaïnamide  
Veuillez informer v  
pourraient être affe

• Les médicaments  
pourraient abaisser l  
glycémie lorsque v

# Ramipril Win®

5 mg 10 mg

Ra

54,00

Con

Veu  
mén

- Ga
- Si
- votre
- Ce
- d'autre
- Si l'u
- mentionne



1. Qu'est-ce que Ramipril Win, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Ramipril Win, comprimé sécable ?
3. Comment prendre Ramipril Win, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Ramipril Win, comprimé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE RAMIPRIL WIN, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique

Ramipril Win, comprimé sécable contient un médicament appelé ramipril. Celui-ci fait partie d'un groupe de médicaments appelés IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion).

Ramipril Win, comprimé sécable agit en :

- Diminuant la production par votre organisme de substances susceptibles d'élever votre pression artérielle,
- Faisant se relâcher et se dilater vos vaisseaux sanguins,
- Facilitant à votre cœur le pompage du sang à travers l'organisme.

### Indications thérapeutiques

Ramipril Win, comprimé sécable peut être utilisé :

- Pour traiter une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour réduire le risque d'avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.
- Pour réduire le risque ou retarder l'aggravation de problèmes rénaux (que vous soyez ou non diabétique).
- Pour traiter votre cœur lorsqu'il ne peut pas pomper une quantité suffisante de sang dans le reste de votre organisme (insuffisance cardiaque).
- En traitement à la suite d'une crise cardiaque (infarctus du myocarde) compliquée d'insuffisance cardiaque.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE RAMIPRIL WIN, comprimé sécable ?

### Contre-indications

**Ne prenez jamais Ramipril Win, comprimé sécable :**

- Si vous présentez une allergie (hypersensibilité) au ramipril, à tout autre IEC, ou à l'un des autres composants contenus dans Ramipril Win, comprimé sécable listés à la rubrique Informations supplémentaires.
- Les signes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée (rash), des problèmes de déglutition ou de respiration, un gonflement de vos lèvres, de votre visage, de votre gorge ou de votre langue.
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave appelée « angioédème ». Les signes comparent des démangeaisons, une urticaire, des marques rouges sur les mains, les pieds et la gorge, un gonflement de la gorge et de la langue, un gonflement autour des yeux et des lèvres, des difficultés à respirer et à avaler.
- Si vous subissez une dialyse ou tout autre type de filtration sanguine. En fonction de la machine utilisée, Ramipril Win, comprimé sécable pourrait ne pas vous convenir.
- Si vous avez des problèmes rénaux du fait de la réduction de l'apport sanguin à votre rein (sténose de l'artère rénale).
- Si vous êtes enceinte depuis plus de 3 mois. Il est également préférable d'éviter de prendre

Ramipril Win, co  
allaitemen

• Si votre pression  
prenez pas Ra  
terne. Si vous  
primé sécable.  
cautions d'e  
ez auprès de  
vous souffrez d  
vous avez per  
la diarrhée, s  
étiques depuis  
vous allez suiv  
sensibilisatio  
Si vous allez r  
Intervention chirur  
traitement par Ra  
médecin.

• Si votre taux sang  
• Si vous souffrez d  
érythémateux systé  
• Vous devez inform  
Ramipril est décon  
plus de 3 mois, ca  
ce stade de la gros

### Enfant

L'utilisation de ram  
car la tolérance et l  
Si l'un ou l'autre de  
à votre médecin av

### Interactions ave

### Prise d'autres m

Veuillez informer v  
d'autres médicam  
ordonnance (en in  
certains autres mé  
sur Ramipril Win, o  
Veuillez informer v  
peuvent rendre Ra

• Les médicaments  
anti-inflammatoires  
• Les médicaments  
d'une insuffisance  
ou l'adrénaline. Vo  
Veuillez informer v  
peuvent augmenter  
Ramipril Win, com

• Les médicaments  
anti-inflammatoires  
• Les médicaments

• Les médicaments  
• Les diurétiques te  
• Les médicaments

que la spironolacto  
pour fluidifier le sa

• Les corticoïdes d  
• L'allopurinol (uti

Le procaïnamide  
Veuillez informer v  
pourraient être affe

• Les médicaments  
pourraient abaisser l  
glycémie lorsque v

# Ramipril Win®

5 mg 10 mg

Ra

54,00

Con

Veu  
mén

- Ga
- Si
- votre
- Ce
- d'autre
- Si l'u
- mentionne



1. Qu'est-ce que Ramipril Win, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Ramipril Win, comprimé sécable ?
3. Comment prendre Ramipril Win, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Ramipril Win, comprimé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE RAMIPRIL WIN, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique

Ramipril Win, comprimé sécable contient un médicament appelé ramipril. Celui-ci fait partie d'un groupe de médicaments appelés IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion).

Ramipril Win, comprimé sécable agit en :

- Diminuant la production par votre organisme de substances susceptibles d'élever votre pression artérielle,
- Faisant se relâcher et se dilater vos vaisseaux sanguins,
- Facilitant à votre cœur le pompage du sang à travers l'organisme.

### Indications thérapeutiques

Ramipril Win, comprimé sécable peut être utilisé :

- Pour traiter une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour réduire le risque d'avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.
- Pour réduire le risque ou retarder l'aggravation de problèmes rénaux (que vous soyez ou non diabétique).
- Pour traiter votre cœur lorsqu'il ne peut pas pomper une quantité suffisante de sang dans le reste de votre organisme (insuffisance cardiaque).
- En traitement à la suite d'une crise cardiaque (infarctus du myocarde) compliquée d'insuffisance cardiaque.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE RAMIPRIL WIN, comprimé sécable ?

### Contre-indications

**Ne prenez jamais Ramipril Win, comprimé sécable :**

- Si vous présentez une allergie (hypersensibilité) au ramipril, à tout autre IEC, ou à l'un des autres composants contenus dans Ramipril Win, comprimé sécable listés à la rubrique Informations supplémentaires.
- Les signes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée (rash), des problèmes de déglutition ou de respiration, un gonflement de vos lèvres, de votre visage, de votre gorge ou de votre langue.
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave appelée « angioédème ». Les signes comparent des démangeaisons, une urticaire, des marques rouges sur les mains, les pieds et la gorge, un gonflement de la gorge et de la langue, un gonflement autour des yeux et des lèvres, des difficultés à respirer et à avaler.
- Si vous subissez une dialyse ou tout autre type de filtration sanguine. En fonction de la machine utilisée, Ramipril Win, comprimé sécable pourrait ne pas vous convenir.
- Si vous avez des problèmes rénaux du fait de la réduction de l'apport sanguin à votre rein (sténose de l'artère rénale).
- Si vous êtes enceinte depuis plus de 3 mois. Il est également préférable d'éviter de prendre

Ramipril Win, co  
allaitemen

• Si votre pression  
prenez pas Ra  
terne. Si vous  
primé sécable.  
cautions d'e  
ez auprès de  
vous souffrez d  
vous avez per  
la diarrhée, s  
étiques depuis  
vous allez suiv  
sensibilisatio  
Si vous allez r  
Intervention chirur  
traitement par Ra  
médecin.

• Si votre taux sang  
• Si vous souffrez d  
érythémateux systé  
• Vous devez inform  
Ramipril est décon  
plus de 3 mois, ca  
ce stade de la gros

### Enfant

L'utilisation de ram  
car la tolérance et l  
Si l'un ou l'autre de  
à votre médecin av

### Interactions ave

### Prise d'autres m

Veuillez informer v  
d'autres médicam  
ordonnance (en in  
certains autres mé  
sur Ramipril Win, o  
Veuillez informer v  
peuvent rendre Ra

• Les médicaments  
anti-inflammatoires  
• Les médicaments  
d'une insuffisance  
ou l'adrénaline. Vo  
Veuillez informer v  
peuvent augmenter  
Ramipril Win, com

• Les médicaments  
anti-inflammatoires

• Les médicaments  
que la spironolacto  
pour fluidifier le sa

• Les corticoïdes o

• L'allopurinol (uti

Le procaïnamide

Veuillez informer v  
pourraient être af

• Les médicaments  
pourrait abaisser la  
glycémie lorsque v

27,50

a 5° mésants	Diclo pharma 5° 100 mg suppositoires
	100 mg
rimé	q.s.p. 1 suppositoire

M. rhumatisante, arrite rhumatismale, ostéoarthrose. Maladies articulaires, bursites, tendinites, myosites, lombosciatalgies.

#### **CONTRE-INDICATIONS**

Le produit doit pas être administré en cas d'ulcère gastrique ou duodénal, de graves troubles gastro-entériques, de grossesse, durant l'allaitement, d'insuffisance rénale ou d'altération de l'hémopoïèse ou en cours de traitement avec les anticoagulants.

Comme d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, le Diclofénac est contre-indiqué chez les sujets qui après administration d'acide acétylsalicylique ou d'autres médicaments qui inhibent la prostaglandine synthétase, ont présenté des crises asthmatiques, l'urticaire ou rhinite aiguë. De plus, il est contre-indiqué dans les cas d'hypersensibilité individuelle vérifiée au Diclofénac. Enfant de moins de 15 ans pour les injectables et les suppositoires et moins de 12 ans pour les comprimés.

#### **EFFETS INDÉSIRABLES**

Surtout au début du traitement on pourra enregistrer des troubles gastro-intestinaux tels que nausées, diarrhées, flatulences.

Si des troubles plus graves se présentent (selles foncées ou douleurs épigastriques), il faudra consulter un médecin.

Rarement, on aura des manifestations allergiques telles que rash cutané, prurit, crises asthmatiques et/ou réactions anaphylactiques ou anaphylactoides.

Quelquefois, on a enregistré des troubles du SNC tels que céphalée, excitation, irritabilité, insomnie, asthénie, épuisements.

En cas particulier dans les traitements prolongés, peuvent se présenter des oedèmes périphériques, une augmentation des transaminases, l'ulcère, des altérations de l'hémopoïèse (leucopénie, thrombopénie, anémie aplasique), une insuffisance rénale, un syndrome néphrotique, un érythème exsudatif multiforme. Quelquefois, rarement, chez des sujets l'emploi des suppositoires peut déterminer l'apparition de phénomènes collatéraux locaux et transitoires (brûlures, ténèse).

#### **POSÉOLOGIE**

Comprimés gastro-résistants de 50 mg : Thérapie d'attaque : 1 comprimé, 3 fois/jour. Thérapie prolongée : 1 comprimé, 2 fois/jour (le matin et le soir) ; dans certains cas on prévoit une réduction de la posologie).

Administrer durant ou après les repas (le petit déjeuner et le dîner).

Suppositoires de 100 mg : 1 suppositoire, 1-2 fois/jour.

La thérapie rectale peut être associée à la thérapie orale : 1 suppositoire, le soir, et 1 comprimé de 50 mg lors du petit déjeuner.

Ampoules injectables de 75 mg : 1 ampoule/jour par voie intramusculaire pendant 2 jours puis passer aux comprimés ou aux suppositoires.

#### **PRÉSENTATIONS**

Boîte de 20 comprimés gastro-résistants de 50 mg.

Boîte de 10 suppositoires de 100 mg.

Boîte de 6 ampoules injectables de 75 mg.

Boîte de 2 ampoules injectables de 75 mg.

**NE PAS LAISSEZ A LA PORTEE DES ENFANTS**

**LISTE II**

A19452  
 Réamot



**FLOXAM®**

PPV 116DH40

LOT  
EXP 00044 4  
02/2021

**PRESENTATIONS :**

- Boîte de 16 gélules à 500 mg / 5 ml
- Boîte de 24 gélules à 500 mg / 5 ml
- Flacon de 12 doses d'injection intra-musculaire (Alcool benzyllique à 3 %)
- Flacon de 20 doses d'injection intra-musculaire (Alcool benzyllique à 3 %)
- Boîte de 1 flacon à 500 mg / 5 ml
- Boîte de 1 flacon à 3 %) d'injection intra-musculaire (Alcool benzyllique à 3 %)
- Boîte de 6 flacons à 500 mg / 5 ml
- Boîte de 1 flacon à 3 %) d'injection intra-musculaire (Alcool benzyllique à 3 %)

**COMPOSITION :**

- Gélules à 500 mg

Flucloxacilline (1)

Excipient qs 1 g.

- Poudre pour susp.

Flucloxacilline (DCI) 250 mg (1)

Excipient qsp 6,5 g de poudre par flacon.

- Injectables à 250 mg :

Flacon de poudre contenant 250 mg de Flucloxacilline (DCI) (sous forme de sel sodique monohydraté) + ampoule de 3 ml de solvant eau pour préparations injectables.

- Injectables à 500 mg :

Flacon de poudre contenant 500 mg de Flucloxacilline (DCI) (sous forme de sel sodique monohydraté) + ampoule de 5 ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzyllique à 3 %

- Injectables à 1 g :

Flacon de poudre contenant 1 g de Flucloxacilline (DCI) (sous forme de sel sodique monohydraté) + ampoule de 5 ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzyllique à 3 %

**PROPRIETES :**

Antibiotique de la famille des bêta-lactamines du groupe des pénicillines isoxazoles semi-synthétiques, résistant à la pénicillinase staphylococcique ainsi qu'à l'acidité gastrique.

La Flucloxacilline est bactéricide. Elle agit au niveau de la synthèse de la paroi bactérienne.

Spectre d'activité : c'est avant tout un anti-staphylococcique, actif sur : staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis, streptococcus pyogenes, streptococcus pneumoniae, s. viridans, clostridium spp, bacillus anthracis, neisseria spp

La Flucloxacilline diffuse largement dans les tissus. Elle est retrouvée dans le muscle, les poumons, les liquides d'épanchement péricardique, pleural, synovial, la lymphe, l'abcès non caséux, le tissu sous-cutané, les amygdales, l'os et l'oreille moyenne.

**INDICATIONS :**

Découlent de son activité bactéricide anti-staphylococcique.

Son intérêt réside dans les staphylococcies cutanées, muqueuses, et les localisations de la sphère ORL.

Prophylaxie des infections post-opératoires (chirurgie cardio-thoracique et orthopédique).

Dans les infections pleuro-pulmonaires, ostéoarticulaires, les septicémies, les endocardites, le choc septique et les infections méningées, une association est habituellement conseillée.

Ce médicament ne contenant pas de sucre, il peut être administré au diabétique et en cas de mauvais état dentaire ou de régime hypocalorique.

**POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :**

Voie orale : (1/2 heure avant les repas)

Adultes : 500 mg 3 à 4 fois / 24 heures

Enfants et Nourrissons : 25 à 50 mg/kg/jour en 2 à 3 prises, soit une cuillerée-mesure

dosée à 250 mg / 5 ml 2 à 3 fois par jour

SYSTÈME DE GESTION QUALITÉ

PAR CERTIFICATION

CERTIFIÉ ISO 9001:2008

ESNAPHARM

SA

Rue Adolphe-Benellioun

7,

Lausanne

Switzerland

Impôts et distributeur ESNAPHARM

Via delle Industrie 1

Alissola (SV) Italy

Produit fabriqué par ESNAT SpA

Maastricht extension - Casablanca

Importeur et distributeur ESNAPHARM - 7, Rue Adolphe-Benellioun

www.esnapharm.com

Via delle Industrie 1 Alissola (SV) Italy

Produit fabriqué par ESNAT SpA

## COMPLÉMENT ALIMENTAIRE, CE N'EST PAS UN MÉDICAMENT

- Boîte de 40 comprimés
- Boîte de 20 comprimés
- Boîte de 40 comprimés

### Présentations :

- Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée
- Tenir hors de la portée des enfants
- Ne pas utiliser pendant la grossesse

### Précautions d'emploi :

2 à 4 comprimés par jour

### Conseils d'utilisation :

Confort digestif et intestinal

### Propriétés :

Hydroxypropylmethylcellulose, acides gras, cellulose, sucrose, gocristalline.

### هيبانات

٢٠ قرص

A consommer de préférence avant fin :

à lot

HD 08,99 H

Lot : 101001 Per : 11-2021



0,7 mg. Rhamnus alpinus

0,7 mg. Fructus Euonymi

0,7 mg. Fructus cornuti

Composition par comprimé de 400 mg :

Le diéticien

HEPANAT®