

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## **Conditions générales :**

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## **Pharmacie :**

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## **Diologie et Biologie :**

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## **Optique :**

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## **Éducation :**

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## **Dentaire :**

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## **Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :**

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## **Adresses Mails utiles**

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

## **Déclaration de Maladie : N° P19-0003705**

**Maladie**

**Dentaire**

**Optique**

**Autres**

### **Cadre réservé à l'adhérent (e)**

Matricule : 8606 Société : RAM

**Actif**

**Pensionné(e)**

**Autre :** .....

Nom & Prénom : GZR FOULAL Hiba Date de naissance : 23/06/1955

Adresse : RES EL FOUTAKBAL GH 26 IMM 23 S N° 5

Tél. : 0699468065 Total des frais engagés : ..... Dhs

### **Cadre réservé au Médecin**

Cachet du médecin :

*Dr. Fatima EL KHERRAT*  
Médecine Générale  
Spécialiste  
Résid. Al Nakhal El Kbal GH 4 m'm 103 N°3  
1er Etage Sidi Maârouf - Casablanca  
Tél. 05 22 20 45 45 GSM: 0661 18 51 01

Date de consultation : 11/05/2007

Nom et prénom du malade : EL GHARBIYANI KARIMA Age : 57 ans

Lien de parenté :  **Lui-même**  **Conjoint**  **Enfant**

Nature de la maladie : .....

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : 11 OCT. 2007

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : ..... / ..... /

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
11/10/19	Conc			 Dr. Fatima ELKHERRAT Médecine Générale Nutritionniste Ass. Al Mostakbal GH - Im. Tous les deux Sidi Madarouf - Casablanca - 105101

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	11/10/19	1160.40

### ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

### O.D.F PROTHESES DENTAIRES

### DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	35533411	11433553



[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXEC

Médecine Générale

Omnipraticienne Nutritionniste diplômée (Canada)

Spécialiste en médecine de Travail (Rennes-France)

## Diplômée d'Echographie



الطب العام

حائزة على دبلوم التغذية بكلية الطب كندا

## أخصائية طب الشغل كلية الطب (رانس - فرنسا)

## حائزه على دبلوم الفحص بالصدى

Casablanca, le

14 OCT. 2019

الدار البيضاء في

Fig 5. Chrysanthemum

6, 8

b. thyroid 25 mg

I go to the theatre often

le 58 Ed 3 M

142.10 X>

~~Medic~~ got 1 Cg Lysine

S C P LAW H K J C

165 T 65 1d 1 mo

إقامة المستقبل GH4 عمارة 103 ش 3 - ط 1 - سidi معروف - الدار البيضاء  
Résid. AL Mostakbal GH4 imm. 103 N°3. 1er Etage Sidi Maàrouf - Casablanca  
الهاتف: 05 22 97 20 36 - النقال: 18 51 01 66

39 Amuril D gr  
55.0 D q P (15) 1st stage of

W. F. L. D. S. C. E. R. P. M. G. O. K.  
192.20x12.45  
L.S.P.

PS08423

SYNTHEMEDIC  
22 rue zoubair bno al ouam reches  
noires casablanca  
INEXIUM

40 mg Cpr GR  
Boîte 14

641/15DMP/21/NRQ P.P.V : 142,100H  
6 118001 020607

**INEXIUM® 40 mg,  
comprimé  
gastro-résistant  
ésoméprazole**

إينكسيوم® 40 ملخ،  
قرص صا مد لحموضة  
المعدة  
ازومبرازول

PS08423

SYNTHEMEDIC  
22 rue zoubair bno al ouam reches  
noires casablanca  
INEXIUM

40 mg Cpr GR  
Boîte 14

641/15DMP/21/NRQ P.P.V : 142,100H  
6 118001 020607

**INEXIUM® 40 mg,  
comprimé  
gastro-résistant  
ésoméprazole**

إينكسيوم® 40 ملخ،  
قرص صا مد لحموضة  
المعدة  
ازومبرازول

PS08423

SYNTHEMEDIC  
22 rue zoubair bno al ouam reches  
noires casablanca  
INEXIUM

40 mg Cpr GR  
Boîte 14

641/15DMP/21/NRQ P.P.V : 142,100H  
6 118001 020607

**INEXIUM® 40 mg,  
comprimé  
gastro-résistant  
ésoméprazole**

إينكسيوم® 40 ملخ،  
قرص صا مد لحموضة  
المعدة  
ازومبرازول

# NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



## LEVOHYROX® comprimé sécable

Lévothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LEVOHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOHYROX, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LEVOHYROX, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVOHYROX, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### **1. Qu'est-ce que LEVOHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?**

Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament est une hormone thyroïdienne.

Indications thérapeutiques

les suivantes :

de la glande thyroïde),

L'association de Lévothyrox à des antithyroïdiens dans le traitement de l'hyperthyroïdie n'est pas indiquée au cours de la grossesse. En effet, Lévothyrox passe très peu la barrière placentaire, alors que les antithyroïdiens passent facilement celle-ci. Il en résulterait un risque d'hypothyroïdie chez le fœtus.

L'allaitement est possible pendant le traitement.

L'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie sont susceptibles d'altérer la fertilité. Le traitement d'une hypothyroïdie par Lévothyrox doit donc être adapté sur la base d'une surveillance biologique car un sous-dosage est susceptible de ne pas améliorer l'hypothyroïdie et un surdosage peut entraîner une hyperthyroïdie.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

### **3. Comment prendre LEVOHYROX, comprimé sécable ?**

Posologie, Mode et/ou voie(s), d'adminis-

PPV : 55.00 DH  
LOT : 619192  
PER : 01/21

**Amoxil** 500mg et 1 g comprimés dispersibles, boîte de 12 et 24,

**Amoxil** 125 mg, 250mg et 500mg, poudre pour suspension buvable,  
flacon de 60 ml.

## Amoxicilline

### Précaution du médicament

Avant d'utiliser attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car il contient des informations importantes pour vous.

Si vous avez des questions, lisez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. Si le médicament que vous prenez a été prescrit à vous ou à votre enfant. Ne le donnez pas à vos amis ou personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que AMOXIL et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AMOXIL ?

3. Comment prendre AMOXIL ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver AMOXIL ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE AMOXIL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### Classe pharmacothérapeutique

Qu'est-ce que AMOXIL ?

AMOXIL est un antibiotique. Le principe actif est l'amoxicilline. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines ».

Dans quels cas AMOXIL est-il utilisé ?

AMOXIL est utilisé pour traiter des infections causées par des bactéries dans différentes parties du corps.

AMOXIL peut également être utilisé en association à d'autres médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AMOXIL ?

Ne prenez jamais AMOXIL :

• Si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

• Si vous avez déjà présenté une réaction allergique à un antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou de la gorge.

Ne prenez pas AMOXIL si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

si vous:

• souffrez d'une maladie infectieuse (fièvre, maux de gorge, ganglions enflés et fatigues, etc.)

• avez des problèmes rénaux

• N'urinez pas régulièrement

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

#### Tests sanguins et urinaires

Si vous devez effectuer :

• Des analyses d'urine (dosage du glucose) ou des analyses de sang pour explorer le fonctionnement de votre foie,

• Un dosage d'estriol (utilisé pendant la grossesse pour vérifier que le bébé se développe normalement).

Informez votre médecin ou votre pharmacien que vous prenez AMOXIL. En effet, AMOXIL peut influer sur les résultats de ces tests.

#### Enfants

Sans objet.

#### Autres médicaments et AMOXIL :

Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

• Si vous prenez de l'alloprionol (utilisé dans le traitement de la goutte) avec AMOXIL, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

• Si vous prenez du probénécid (utilisé dans le traitement de la goutte), votre médecin peut décider d'adapter votre dose d'AMOXIL.

• Si vous prenez des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine), vous pourriez avoir besoin d'effectuer des analyses sanguines supplémentaires.

- Si vous prenez d'autres anti-inflammatoires, ils peuvent être moins efficaces.

- Si vous prenez du méthotrexate (utilisé dans le traitement du cancer et du psoriasis sévère) AMOXIL peut provoquer une augmentation des effets indésirables.

### AMOXIL avec des aliments et boissons :

#### Sans objet

#### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### Sportifs

Sans objet.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

AMOXIL peut provoquer des effets indésirables (comme des réactions allergiques, des vertiges et des convulsions) susceptibles de réduire votre capacité à conduire. Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines à moins que vous vous sentiez bien.

#### AMOXIL comprimé dispersible contenu de l'aspartam

L'aspartam (E951) est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive pour les patients ayant une maladie appelée « phénylcétonurie ».

#### AMOXIL poudre pour suspension buvable contenu :

- L'aspartam (E951) est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive pour les patients ayant une maladie appelée « phénylcétoneurie ».
- Le maltodextrine est absorbée sous forme de glucose. Si votre médecin vous a informé que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
- En raison de la présence de benzoate de sodium (E221), ce médicament peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et des muqueuses et peut accroître le risque de jaunisse chez le nouveau-né.

### 3. COMMENT PRENDRE AMOXIL ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

• Faire dissoudre complètement chaque comprimé dans un verre d'eau et bien remuer le mélange jusqu'à ce qu'il soit homogène. Avaler immédiatement le mélange ;

• Agiter bien le flacon avant chaque utilisation et utiliser la cuillère fournie avec le flacon ;

• Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être espacées d'au moins 4 heures.

#### Posologie :

#### Enfants pesant moins de 40 kg

Toutes les posologies sont déterminées en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.

• Votre médecin vous indiquera la quantité d'AMOXIL que vous devez administrer à votre bébé ou votre enfant.

• La posologie habituelle est de 40 mg à 90 mg par kilogramme de poids corporel et par jour, à administrer en deux ou trois prises.

• La dose maximale recommandée est de 100 mg par kilogramme de poids corporel et par jour.

#### Adultes, patients âgés et enfants pesant 40 kg ou plus

La forme suspension n'est pas adaptée aux adultes et enfants de plus de 40 Kg. La posologie habituelle d'AMOXIL est de 250 mg à 500 mg trois fois par jour ou 750 mg à 1 g toutes les 12h, selon la sévérité et le type d'infection.

• Infections sévères : 750 mg à 1 g trois fois par jour.

• Infection des voies urinaires : 3 g deux fois par jour pendant un jour.

• Maladie de Lyme (infection transmise par des parasites appelés tiques) : érythème migrant isolé (phase précoce - éruption cutanée circulaire rouge ou rose) : 4 g par jour, manifestations systémiques (phase tardive - avec des symptômes plus graves ou quand la maladie est étendue à tout le corps) : jusqu'à 6 g par jour.

• Ulcère de l'estomac : 750 mg ou 1 g deux fois par jour pendant 7 jours avec d'autres antibiotiques et médicaments destinés à traiter les ulcères de l'estomac.

• Pour prévenir les infections cardiaques en cas de chirurgie. La posologie varie selon le type de chirurgie. D'autres médicaments peuvent également être administrés simultanément. Votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère pourra vous donner plus de détails.

**ZECLAR**

**500 mg Clarithromycine**

192,20

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### **1. QU'EST-CE QUE ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

#### **Classe pharmacothérapeutique - code ATC :**

#### **ANTIBIOTIQUE de la famille des macrolides**

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines infections bactériennes à permis sensibles.

Il est également indiqué dans le traitement d'ulcère de l'estomac (duodénal ou gastrique).

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé ?**

**Ne prenez jamais ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) aux antibiotiques de la famille des macrolides ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
  - Si vous prenez d'autres médicaments connus pour provoquer des troubles graves du rythme cardiaque.
  - En association avec : - la colchicine (médicament utilisé dans le traitement de la goutte), - l'alfuzosine (médicament utilisé dans le traitement des troubles de la prostate), - la dapoxétine (médicament utilisé dans le traitement de l'éjaculation précoce), - l'avanafil (médicament dans le traitement de l'impuissance sexuelle), - la dronedarone (médicament utilisé en cas de troubles du rythme cardiaque), - l'ergotamine, la dihydroergotamine, la méthylergometrine, le méthysergide (médicaments de la migraine), - l'ivabradine (médicament anti-angoreux), - l'éplérénione (médicament utilisé dans le traitement de certains cas d'insuffisance cardiaque), - la mizolastine (antihistaminique utilisé dans l'allergie), - le pimozide (neuroleptique utilisé pour certains troubles du comportement), - la quetiapine (médicament utilisé dans le traitement de la schizophrénie), - la ranolazine (médicament utilisé dans le traitement des symptômes de l'angine de poitrine), - la simvastatine (médicament utilisé pour réduire le taux de cholestérol dans le sang), - le cisapride (médicament utilisé en cas de reflux gastro-oesophagien), - l'astémizole (médicament utilisé en cas d'allergie), - la terfénadine (médicament utilisé en cas d'allergie), - le ticagrelor (médicament utilisé pour réduire le risque de crise cardiaque ou d'accident ou d'accident vasculaire cérébral), - le lomitapide (médicament donné pour traiter une maladie génétique augmentant le taux de cholestérol dans le sang),  
(voir rubrique « Autres médicaments et ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé »).
  - Si vous avez un allongement de l'intervalle QT.

En cas de doute, il est indispensable de consulter votre pharmacien.

#### Avertissements et précautions

Informez votre médecin ou votre pharmacien de l'usage d'antibiotiques, pour éviter une possible surinfection.

**Ce médicament ne doit pas être associé à la colchicine (médicament utilisé dans le traitement de l'arthrite goutteuse).**

- la simvastatine (médicament utilisé dans le sang) en raison du risque

notamment de rhabdomyolyse (d). Informez votre médecin ou votre

statines (médicaments qui réduisent l'adéquation de la prescription pour

Informez votre médecin en cas :  
• de maladie du foie (insuffisance hépatique)

- de maladie du foie (insuffisance hépatique) et de la rate (insuffisance rénale)
- de maladie des reins (insuffisance rénale)

- de maladie des reins d'insuffisance rénale s'avérant nécessaire.
  - d'allongement de l'intervalle QT, d'une élévation du potassium dans le sang ou de prise d'autre allongement de l'intervalle QT.
  - de diarrhée en cours ou après votre traitement comprimé pelliculé en particulier si elle est sanguinolente (risque de colite pseudomembraneuse).
  - de prise concomitante de ZECLAR 50 mg d'anticoagulants oraux (warfarine) (risque de déréglement de la coagulation (INR et tau) fréquemment surveillé).
  - de taux anormalement bas de magnésium (hypomagnésémie).

#### La prise concomitante de clarithromyc

- la tamsulosine (médicament utilisé dans la prostate),
  - la bromocriptine, la cabergoline, le lisuride utilisés dans la maladie de Parkinson ou maternel),
  - le disopyramide (médicament utilisé dans les cardiaques),
  - l'ébastine (antihistaminique utilisé dans la rhinite),
  - la fesotérodine (médicament utilisé dans l'incontinence urinaire),
  - l'halofantrine (médicament utilisé dans les maladies tropicales),
  - les immunosuppresseurs (cyclosporine, éuvacitinib),
  - l'irinotecan, l'érubicine, le bosutinib, le rétamoxifène anti-cancéreux),
  - la luméfentanyl (médicament utilisé dans les douleurs),
  - l'oxycodone (médicament utilisé dans les douleurs intenses),
  - le rivaroxaban (médicament anticoagulant),
  - la tolterodine (médicament utilisé dans l'incontinence urinaire),
  - la bêtaquiline (médicament utilisé dans les maladies respiratoires),
  - la fidaxomicine (antibiotique),
  - le siméprévir (médicament utilisé dans les infections par le VIH),
  - le riociguat (médicament utilisé dans les maladies pulmonaires),

(voir rubrique « Autres médicaments particuliers »).

# **ZECLAR**

**500 mg Clarithromycine**

192,20

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### **1. QU'EST-CE QUE ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique - code ATC :

#### **ANTIBIOTIQUE de la famille des macrolides**

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines infections bactériennes à permis sensibles.

Il est également indiqué dans le traitement d'ulcère de l'estomac (duodénal ou gastrique).

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé ?**

**Ne prenez jamais ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) aux antibiotiques de la famille des macrolides ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
  - Si vous prenez d'autres médicaments connus pour provoquer des troubles graves du rythme cardiaque.
  - En association avec : - la colchicine (médicament utilisé dans le traitement de la goutte), - l'alfuzosine (médicament utilisé dans le traitement des troubles de la prostate), - la dapoxétine (médicament utilisé dans le traitement de l'éjaculation précoce), - l'avanafil (médicament dans le traitement de l'impuissance sexuelle), - la dronedarone (médicament utilisé en cas de troubles du rythme cardiaque), - l'ergotamine, la dihydroergotamine, la méthylergometrine, le méthysergide (médicaments de la migraine), - l'ivabradine (médicament anti-angoreux), - l'éplérénione (médicament utilisé dans le traitement de certains cas d'insuffisance cardiaque), - la mizolastine (antihistaminique utilisé dans l'allergie), - le pimozide (neuroleptique utilisé pour certains troubles du comportement), - la quetiapine (médicament utilisé dans le traitement de la schizophrénie), - la ranolazine (médicament utilisé dans le traitement des symptômes de l'angine de poitrine), - la simvastatine (médicament utilisé pour réduire le taux de cholestérol dans le sang), - le cisapride (médicament utilisé en cas de reflux gastro-oesophagien), - l'astémizole (médicament utilisé en cas d'allergie), - la terfénadine (médicament utilisé en cas d'allergie), - le ticagrelor (médicament utilisé pour réduire le risque de crise cardiaque ou d'accident ou d'accident vasculaire cérébral), - le lomitapide (médicament donné pour traiter une maladie génétique augmentant le taux de cholestérol dans le sang),  
(voir rubrique « Autres médicaments et ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé »).
  - Si vous avez un allongement de l'intervalle QT.

En cas de doute, il est indispensable de consulter votre pharmacien.

#### Avertissements et précautions

Informez votre médecin ou votre pharmacien de l'utilisation d'antibiotiques, pour éviter une possible surinfection.

**Ce médicament ne doit pas être associé à la colchicine (médicament utilisé dans le traitement de l'arthrite goutteuse).**

- la simvastatine (médicament utilisé dans le sang) en raison du risque de

notamment de rhabdomyolyse (d). Informez votre médecin ou votre

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des statines (médicaments qui réduisent le cholestérol). Une adaptation de la prescription peut être nécessaire.

adéquate de la prescription pour Informez votre médecin en cas :  
- de maladie du foie (cirrhose, etc.)

- de maladie ou de vie (assurance maladie et retraite)

- de maladie des reins (insuffisance rénale) s'avérer nécessaire.
  - d'allongement de l'intervalle QT, d'une carence en potassium dans le sang ou de prise d'autre médicament allongeant de l'intervalle QT.
  - de diarrhée en cours ou après votre traitement comprimé pelliculé en particulier si elle est sanglante (risque de colite pseudomembraneuse).
  - de prise concomitante de ZECLAR 50 mg d'anticoagulants oraux (warfarine) (risque de déréglement de la coagulation (INR) et taux fréquemment surveillé).
  - de taux anormalement bas de magnésium (hypomagnésémie).

#### La prise concomitante de clarithromyc

- la tamsulosine (médicament utilisé dans la prostate),
  - la bromocriptine, la cabergoline, le lisuride utilisés dans la maladie de Parkinson ou maternel),
  - le disopyramide (médicament utilisé dans les cardiaques),
  - l'ébastine (antihistaminique utilisé dans la rhinite),
  - la fésotérodine (médicament utilisé dans l'incontinence urinaire),
  - l'halofantrine (médicament utilisé dans le paludisme),
  - les immunosuppresseurs (cyclosporine, évanthromide),
  - l'irinotecan, l'érubicine, le bosutinib, le régifitinib (anti-cancéreux),
  - la luméfénadrine (médicament utilisé dans les insomnies),
  - l'oxycodone (médicament utilisé dans les douleurs intenses),
  - le rivaroxaban (médicament anticoagulant),
  - la tolterodine (médicament utilisé dans l'incontinence urinaire),
  - la bêdaquiline (médicament utilisé dans la tuberculose),
  - la fidaxomicine (antibiotique),
  - le siméprévir (médicament utilisé dans les infections par le VIH),
  - le riociguat (médicament utilisé dans les maladies pulmonaires),  
(voir rubrique « Autres médicaments à pellicule »).

# NIDAZOI

39,90

## (Métronidazole) Comprimés et ovules

### Composition :

- Comprimés à 250 mg	Métronidazole : ..... 250 mg
	Excipients q.s.p : ..... 1 comprimé
- Comprimés à 500 mg	Excipients à effet notoire : lactose
	Métronidazole : ..... 500 mg
	Excipients q.s.p : ..... 1 comprimé
- Ovules à 500 mg	Excipients à effet notoire : lactose
	Métronidazole : ..... 500 mg
	Excipients q.s.p : ..... 1 ovule

### Propriétés :

Le Métronidazole dérivé Nitro-5 imidazolé est doué d'une double activité :

- Bactéricide sur les bactéries anaérobies strictes
- Parasiticide à l'égard des Trichomonas vaginalis, Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica.

### Indications et posologie :

- Amibiase : pendant 7 jours.
  - \* Adultes : 1,50 g par jour en 3 prises.
  - \* Enfants : 30 à 40 mg / Kg / jour en 3 prises
- Lambliaise : pendant 5 jours.
  - \* Adultes : 0,750 g à 1 g par jour.
  - \* Enfants : de 2 à 5 ans : 250 mg/j (1 comprimé à 250 mg).  
de 5 à 10 ans : 375 mg/j (1 comprimé et demi à 250 mg).  
de 10 à 15 ans : 500 mg/j (2 comprimés à 250 mg).
- Trichomonase :
  - \* Chez la femme (Urétrites et vaginites à trichomonas) : 2 g en une seule prise (4 comprimés à 500 mg) ou traitement mixte de 10 jours comprenant 500 mg par jour par voie orale en 2 prises et 1 ovule par jour. Le partenaire doit être traité.
  - \* Chez l'homme (urétrites à trichomonas) : 2 g en une seule prise ou 500 mg par voie orale en 2 prises pendant 10 jours.
- Vaginites : 500 mg 2 fois par jour pendant 7 jours, un traitement local (1ovule / jour) peut être associé au traitement par voie orale.
- Infections à germes anaérobies :
  - \* Adultes : 1 g à 1,5 g par jour.
  - \* Enfants : 20 à 30 mg / Kg / jour.
- Chimioprophylaxie chirurgicale :
  - \* Adultes : 500 mg toutes les 8 heures et ceci 48 heures avant l'intervention.
  - \* Enfants : 20 à 30 mg / Kg / jour.

### Contre-indications :

Hypersensibilité aux imidazolés.

### Précautions d'emploi :

- Pendant le premier trimestre de la grossesse et au cours de la période de lactation, il est conseillé, par mesure de prudence, d'éviter l'administration orale de métronidazole.
- Eviter les boissons alcoolisées pendant la durée du traitement.

### Effets indésirables :

Ils sont rares :

- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhée, anorexie;
- Signes cutanéomuqueux : urticaire, bouffées vasomotrices, prurit;
- Céphalées, vertiges;
- Leucopénies.

### Formes et présentations :

Comprimés dosés à 250 mg	: Boîte de 20.
Comprimés dosés à 500 mg	: Boîte de 20.
Ovules dosés à 500 mg	: Boîte de 10.

### Conservation :

- Ovules : A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Notice

PPV: 149.60 DH  
 LOT: 19E15/B  
 EXP: 05/2022

## 1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT :

**D-CURE® FORTE 100.000 U.I.,  
 solution buvable en ampoule, boites de 8.**

Substance active : Cholécalciférol (Vitamine D 3).

49,60

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Ampoules buvables de 1 ml de solution huileuse :

**Principe actif :** Cholécalciférol 100.000 U.I.

**Excipients :**

Acétate d'alpha-Tocophérol – Essence d'écorce d'orange douce – Oléate de Polyglycérol (E475) – Huile d'olive raffinée pour faire 1 ml (= une ampoule).

## 3. CLASSE PHARMACEUTIQUE :

Vitamines.

## 4. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

## 5. POSOLOGIE :

**Mode et voies d'administration :**

Administration orale.

Les ampoules doivent être prises ou administrées conformément aux instructions de dosage.

La dose sera prise telle quelle ou en mélange avec des liquides.

**Fréquence d'administration-durée du traitement :**

Utilisez toujours D-CURE FORTE conformément aux instructions de votre médecin. En cas de doute, consultez à nouveau votre médecin ou pharmacien.

La dose quotidienne recommandée est de 1 ampoule par jour.

Notice

PPV: 149.60 DH  
 LOT: 19E15/B  
 EXP: 05/2022

## 1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT :

**D-CURE® FORTE 100.000 U.I.,  
 solution buvable en ampoule, boites de 8.**

Substance active : Cholécalciférol (Vitamine D 3).

49,60

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Ampoules buvables de 1 ml de solution huileuse :

**Principe actif :** Cholécalciférol 100.000 U.I.

**Excipients :**

Acétate d'alpha-Tocophérol – Essence d'écorce d'orange douce – Oléate de Polyglycérol (E475) – Huile d'olive raffinée pour faire 1 ml (= une ampoule).

## 3. CLASSE PHARMACEUTIQUE :

Vitamines.

## 4. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

## 5. POSOLOGIE :

**Mode et voies d'administration :**

Administration orale.

Les ampoules doivent être prises ou administrées conformément aux instructions de dosage.

La dose sera prise telle quelle ou en mélange avec des liquides.

**Fréquence d'administration-durée du traitement :**

Utilisez toujours D-CURE FORTE conformément aux instructions de votre médecin. En cas de doute, consultez à nouveau votre médecin ou pharmacien.

La dose quotidienne recommandée est de 1 ampoule par jour.

Notice

PPV: 149.60 DH  
 LOT: 19E15/B  
 EXP: 05/2022

## 1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT :

**D-CURE® FORTE 100.000 U.I.,  
 solution buvable en ampoule, boites de 8.**

Substance active : Cholécalciférol (Vitamine D 3).

49,60

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Ampoules buvables de 1 ml de solution huileuse :

**Principe actif :** Cholécalciférol 100.000 U.I.

**Excipients :**

Acétate d'alpha-Tocophérol – Essence d'écorce d'orange douce – Oléate de Polyglycérol (E475) – Huile d'olive raffinée pour faire 1 ml (= une ampoule).

## 3. CLASSE PHARMACEUTIQUE :

Vitamines.

## 4. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

## 5. POSOLOGIE :

**Mode et voies d'administration :**

Administration orale.

Les ampoules doivent être prises ou administrées conformément aux instructions de dosage.

La dose sera prise telle quelle ou en mélange avec des liquides.

**Fréquence d'administration-durée du traitement :**

Utilisez toujours D-CURE FORTE conformément aux instructions de votre médecin. En cas de doute, consultez à nouveau votre médecin ou pharmacien.

La dose quotidienne recommandée est de 1 ampoule par jour.

Notice

PPV: 149.60 DH  
 LOT: 19E15/B  
 EXP: 05/2022

## 1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT :

**D-CURE® FORTE 100.000 U.I.,  
 solution buvable en ampoule, boites de 8.**

Substance active : Cholécalciférol (Vitamine D 3).

49,60

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Ampoules buvables de 1 ml de solution huileuse :

**Principe actif :** Cholécalciférol 100.000 U.I.

**Excipients :**

Acétate d'alpha-Tocophérol – Essence d'écorce d'orange douce – Oléate de Polyglycérol (E475) – Huile d'olive raffinée pour faire 1 ml (= une ampoule).

## 3. CLASSE PHARMACEUTIQUE :

Vitamines.

## 4. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

## 5. POSOLOGIE :

**Mode et voies d'administration :**

Administration orale.

Les ampoules doivent être prises ou administrées conformément aux instructions de dosage.

La dose sera prise telle quelle ou en mélange avec des liquides.

**Fréquence d'administration-durée du traitement :**

Utilisez toujours D-CURE FORTE conformément aux instructions de votre médecin. En cas de doute, consultez à nouveau votre médecin ou pharmacien.

La dose quotidienne recommandée est de 1 ampoule par jour.

Notice

PPV: 149.60 DH  
 LOT: 19E15/B  
 EXP: 05/2022

## 1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT :

**D-CURE® FORTE 100.000 U.I.,  
 solution buvable en ampoule, boites de 8.**

Substance active : Cholécalciférol (Vitamine D 3).

49,60

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Ampoules buvables de 1 ml de solution huileuse :

**Principe actif :** Cholécalciférol 100.000 U.I.

**Excipients :**

Acétate d'alpha-Tocophérol – Essence d'écorce d'orange douce – Oléate de Polyglycérol (E475) – Huile d'olive raffinée pour faire 1 ml (= une ampoule).

## 3. CLASSE PHARMACEUTIQUE :

Vitamines.

## 4. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

## 5. POSOLOGIE :

**Mode et voies d'administration :**

Administration orale.

Les ampoules doivent être prises ou administrées conformément aux instructions de dosage.

La dose sera prise telle quelle ou en mélange avec des liquides.

**Fréquence d'administration-durée du traitement :**

Utilisez toujours D-CURE FORTE conformément aux instructions de votre médecin. En cas de doute, consultez à nouveau votre médecin ou pharmacien.

La dose quotidienne recommandée est de 1 ampoule par jour.