

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR VER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Sons générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie. La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

Entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Prothésaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation	: contact@mupras.com
Prise en charge	: pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut	: adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8266

Société : RAN

Actif

Pensionné(e)

Autre : Performac

Nom & Prénom : Mounia Dabila

Date de naissance : 08/05/81

Adresse : Rue Allal Ben Abdellah - Casablanca

Tél. : 06 61 138-134

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr Jamal BENJELLOUN TOUIMI  
Cabinet de Neuro-psychiatrie  
et de Sexologie  
208, Bd. Zer touni - Casablanca  
02 22 95 01 36 - 37

Date de consultation : 22/09/2019

Nom et prénom du malade : Mounia Dabila

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Entérose

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Le : 21/10/2018

Signature de l'adhérent(e) :

Mounia Dabila

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07/10/2019	C3	4000		<i>DR. HABIB BELLOUN TOUMI Neuro-psychiatre Sexologue Bouzai - Casablanca 05.22.27.73.44</i>

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE DE BOURGOGNE BERRADA FAZI Hattima Bd. Zerkouni - Casablanca 05.22.27.73.44</i>	07/10/2019	140700 dh

## ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bila

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
<b>O.D.F</b> <b>PROTHESES DENTAIRES</b>	<b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b>			Coefficient des Travaux
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 35533411 11433553	G		MONTANTS DES SOINS
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Benjelloun Touimi Jamal  
Neuropsychiatre & Psychothérapeute  
Sexologue

Thérapie du Couple

Adulte et Enfants

Electroencephalographie

مصحة بوركون  
PHARMACIE DE BOURGOGNE  
BERRADA TAZI Halima Casablanca; le :  
341, Bd. Zerkouni - Casablanca  
Tél. : 05.22 27 73 44

الدكتور بن جلون التويمي جمال

إختصاصي في الأمراض النفسية والعصبية

الأمراض الجنسية والصعوبات الجنسية

العلاج والتحليل النفسي

التطبيق الكهربائي للدماغ

الكبار والأطفال

الدار البيضاء في :

Ortho Do 19

Marine Delle

80,00

1/ Sénégvelzo 13 1 gpl fr

20,00 x 6  
120,00

2/ Tastar 202 1 gp mch  
2 gp le fr

18,00 x 2  
36,00

3/ Flmact 20 1/2 mch le

Flmact 1/2 60%

0522 95 01 37 / 0522 95 01 36 - الدار البيضاء - الهاتف : 0522 95 01 37 - الفاكس :

203, Bd. Zerkouni - (Près de Twin Center) - 4<sup>th</sup> Etage - Casablanca - Tél : 0522 95 01 36 / 0522 95 01 37

Email : benjellount@menara.ma

Dr. BENJELLOUN TOUMI  
Neuropsychiatre  
Sexologue  
203, Bd. Zerkouni - Casablanca  
Tél : 0522 95 01 37 / 0522 95 01 36  
Email : benjellount@menara.ma

Notice : Information de l'utilisateur

**Seroquel 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg comprimés pelliculés**

qui contiennent de la quetiapine fumarate

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

**Que contient cette notice:**

1. Qu'est-ce que Seroquel et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Seroquel
3. Comment prendre Seroquel
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Seroquel
6. Contenu de l'emballage et autres informations

**1. Qu'est-ce que Seroquel et dans quel cas est-il utilisé**

Seroquel contient une substance qui s'appelle la quetiapine. Cette substance appartient au groupe de médicaments appelés les antipsychotiques. Seroquel peut être utilisé pour traiter diverses maladies telles que :

- Schizophrénie : état dans lequel vous pouvez entendre ou sentir des choses qui ne sont pas présentes, croire des choses qui ne sont pas vraies ou vous sentir inhabituellement suspicieux, anxieux, confus, coupable, tendu ou déprimé.
- Manie : état dans lequel vous pouvez vous sentir très excité, exalté, agité, enthousiaste ou hyperactif ou avoir un mauvais jugement incluant le fait d'être agressif ou perturbateur.
- Dépression bipolaire : état dans lequel vous pouvez avoir un sentiment de tristesse ou vous pouvez vous sentir déprimé, vous sentir coupable, manquer d'énergie, perdre l'appétit ou ne pas parvenir à dormir.

Votre médecin peut continuer à vous prescrire Seroquel même lorsque vous vous sentez mieux.

**2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre**

P046277  
870,00  
SYNTHEMEDIC  
22 rue soukair bno al souam roches  
noires casablanca  
SEROQUEL

300mg  
Boîte de 60  
27118 DMP/21NBF P.P.V: 870,00 DH  
6 118001 021321

**Si vous arrêtez de prendre Seroquel**

Si vous arrêtez brusquement de prendre Seroquel, vous serez incapable de dormir (insomnies), vous serez souffrir de maux de tête, de diarrhées, de vomissements, de vertiges ou d'irritabilité. Votre médecin pourra vous proposer de réduire progressivement la dose avant d'arrêter le traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. Quels sont les effets indésirables éventuels**

Comme tous les médicaments, Seroquel peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si l'un des événements suivants se produit, arrêtez de prendre Seroquel et contactez un médecin ou rendez-vous immédiatement à l'hôpital le plus proche, car vous pourriez avoir besoin de soins médicaux d'urgence:

**Peu fréquent** (affecte moins de 1 personne sur 100):

- Convulsions ou attaques
- Réactions allergiques telles que boursouflures (marbrures), gonflement de la peau et gonflement autour de la bouche
- Mouvements incontrôlables, particulièrement au niveau du visage ou de la langue (dyskinésie tardive).

**Rare** (affecte moins de 1 personne sur 1000):

- Une température élevée (fièvre), maux de gorge persistants ou des ulcères buccaux, respiration plus rapide, transpiration, muscles rigides, une sensation de somnolence ou d'évanouissement, une augmentation importante de la tension artérielle ou du rythme cardiaque.
- Jaunisse (coloration jaune de la peau et des yeux).
- Priapisme (érection prolongée et douloureuse).
- Caillots sanguins dans les veines, en particulier dans les jambes (ces symptômes incluent gonflement, douleur et rougeur dans la jambe), qui peuvent traverser les vaisseaux sanguins jusqu'aux poumons, en causant des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires.

**Très rare** (affecte moins de 1 personne sur 10 000):

- Réaction allergique sévère pouvant provoquer des difficultés respiratoire, vertiges et collapsus.
- Hépatite (inflammation du foie).
- Gonflement rapide de la peau, généralement autour des yeux, des lèvres et de la gorge.

**D'autres effets secondaires possibles:**

et (touche plus de 1 personne)



CONDITION  
CE MEDICAM  
SUR LA LISTE  
SA DELIVRA  
ETRE RENOU

# FLUOXET

Chlorhydrate de fluoxétine.

## INDICATIONS

Ce médicament dépresseur.

Ce médicament dans les états

## CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament

ETRE UTILISÉ

suivants :

- si vous prenez des IMAO (médicament du système nerveux).
- allergie connue à ce médicament.
- enfants de moins de 15 ans.

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

HESITER DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.  
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES

LE MEDECIN  
MENT INDIC

## EFFETS SECONDAIRES

### CONDUIRE DES VÉHICULES OU D'UTILISER DES MACHINES

Ce médicament pouvant modifier l'attention et les capacités de réaction, il convient d'en tenir compte en cas de conduite de véhicules ou d'utilisation de machines.

- NE PAS LE  
UNE AUTRE

## AUTRES EFFETS POSSIBLES DU MEDICAMENT

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

DUREE DE  
NE PAS DEF  
LIMITE D  
INDIQUEE  
L'EMBALLAGE  
A conserver e

Au cours du traitement il est possible que surviennent des troubles digestifs (nausées, vomissement, bouche sèche). Les éruptions cutanées, des douleurs articulaires, de la fièvre, des troubles du foie, des troubles psychiques, une perte de poids : Prévenez votre médecin.

REPRESENTANT  
FLUOXET 20  
Boîte de 10, 2  
LISTE I (TAB)

## POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

La posologie moyenne est de 20 mg/jour soit une gélule par jour. DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

180,00

## MISE EN GARDE

Si vous prenez les IMAO, vous devez respecter un délai d'au moins deux semaines avant la prise de FLUOXET et si vous devez prendre des IMAO après un traitement avec le FLUOXET vous devez respecter un délai de cinq semaines entre les deux traitements.

En cas d'essoufflement ou de toux persistante, il faut prévenir votre médecin.

En cas d'éruption cutanée, prévenir immédiatement votre médecin.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prévenir votre médecin :

- en cas de grossesse.
- en cas de maladie du foie.

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.

EN CAS DE DOUTE NE PAS



CONDITION  
CE MEDICAM  
SUR LA LISTE  
SA DELIVRA  
ETRE RENOU

# FLUOXET

Chlorhydrate de fluoxétine.

## INDICATIONS

Ce médicament dépresseur.

Ce médicament dans les états

## CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament

ETRE UTILISÉ

suivants :

- si vous prenez des IMAO (médicament du système nerveux).
- allergie connue à ce médicament.
- enfants de moins de 15 ans.

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

HESITER DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.  
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES

LE MEDECIN  
MENT INDIC

## EFFETS SECONDAIRES

### CONDUIRE DES VÉHICULES OU D'UTILISER DES MACHINES

Ce médicament pouvant modifier l'attention et les capacités de réaction, il convient d'en tenir compte en cas de conduite de véhicules ou d'utilisation de machines.

- NE PAS LE  
UNE AUTRE

## AUTRES EFFETS POSSIBLES DU MEDICAMENT

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

DUREE DE  
NE PAS DEF  
LIMITE D  
INDIQUEE  
L'EMBALLAGE  
A conserver e

Au cours du traitement il est possible que surviennent des troubles digestifs (nausées, vomissement, bouche sèche). Les éruptions cutanées, des douleurs articulaires, de la fièvre, des troubles du foie, des troubles psychiques, une perte de poids : Prévenez votre médecin.

REPRESENTANT  
FLUOXET 20  
Boîte de 10, 2  
LISTE I (TAB)

## POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

La posologie moyenne est de 20 mg/jour soit une gélule par jour. DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

180,00

## MISE EN GARDE

Si vous prenez les IMAO, vous devez respecter un délai d'au moins deux semaines avant la prise de FLUOXET et si vous devez prendre des IMAO après un traitement avec le FLUOXET vous devez respecter un délai de cinq semaines entre les deux traitements.

En cas d'essoufflement ou de toux persistante, il faut prévenir votre médecin.

En cas d'éruption cutanée, prévenir immédiatement votre médecin.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prévenir votre médecin :

- en cas de grossesse.
- en cas de maladie du foie.

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.

EN CAS DE DOUTE NE PAS

# Témosta® 2,5 mg

Lorazépam

comprimé sécable

## 1. QU'EST-CE C ET DANS QU

**ANXIOLYTIQUE**

Ce médicament

Ce médicament

lorsque celle-ci s

prévention et/ou

sevrage alcoolique.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE

### AVANT DE PRENDRE TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable dans les cas suivants : • allergie connue à cette classe de produits ou à l'un des composants du médicament, • insuffisance respiratoire grave, • syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil), • insuffisance hépatique grave, • myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable

**Mises en garde spéciales** : Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance : • durée du traitement, • dose, antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants.

**Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc...

**Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin.**

La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention.

LOT : 9MA021  
PER.: 04 2021

TEMESTA 2,5MG  
CP SEC B30

P.P.V : 29DH50



6 118000 011576

# Témosta® 2,5 mg

Lorazépam

comprimé sécable

## 1. QU'EST-CE C ET DANS QU

**ANXIOLYTIQUE**

Ce médicament

Ce médicament

lorsque celle-ci s

prévention et/ou

sevrage alcoolique.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE

### AVANT DE PRENDRE TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable dans les cas suivants : • allergie connue à cette classe de produits ou à l'un des composants du médicament, • insuffisance respiratoire grave, • syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil), • insuffisance hépatique grave, • myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable

**Mises en garde spéciales** : Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance : • durée du traitement, • dose, antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants.

**Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc...

**Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin.**

La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention.

LOT : 9MA021  
PER.: 04 2021

TEMESTA 2,5MG  
CP SEC B30

P.P.V : 29DH50



6 118000 011576

# Témosta® 2,5 mg

Lorazépam

comprimé sécable

## 1. QU'EST-CE C ET DANS QU

**ANXIOLYTIQUE**

Ce médicament

Ce médicament

lorsque celle-ci s  
prévention et/ou  
sevrage alcoolique.

LOT : 9MA021  
PER.: 04 2021

TEMESTA 2,5MG

CP SEC B30

P.P.V : 29DH50



6 118000 011576

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable dans les cas suivants : • allergie connue à cette classe de produits ou à l'un des composants du médicament, • insuffisance respiratoire grave, • syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil), • insuffisance hépatique grave, • myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable

**Mises en garde spéciales** : Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance : • durée du traitement, • dose, antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants.

**Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc...

**Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin.**

La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention.

# Témosta® 2,5 mg

Lorazépam

comprimé sécable

## 1. QU'EST-CE C ET DANS QU

**ANXIOLYTIQUE**

Ce médicament

Ce médicament

lorsque celle-ci s

prévention et/ou

sevrage alcoolique.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE

### AVANT DE PRENDRE TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable dans les cas suivants : • allergie connue à cette classe de produits ou à l'un des composants du médicament, • insuffisance respiratoire grave, • syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil), • insuffisance hépatique grave, • myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable

**Mises en garde spéciales** : Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance : • durée du traitement, • dose, antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants.

**Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc...

**Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin.**

La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention.

LOT : 9MA021  
PER.: 04 2021

TEMESTA 2,5MG  
CP SEC B30

P.P.V : 29DH50



6 118000 011576

# Témosta® 2,5 mg

Lorazépam

comprimé sécable

## 1. QU'EST-CE C ET DANS QU

**ANXIOLYTIQUE**

Ce médicament

Ce médicament

lorsque celle-ci s

prévention et/ou

sevrage alcoolique.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE

### AVANT DE PRENDRE TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable dans les cas suivants : • allergie connue à cette classe de produits ou à l'un des composants du médicament, • insuffisance respiratoire grave, • syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil), • insuffisance hépatique grave, • myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable

**Mises en garde spéciales** : Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance : • durée du traitement, • dose, antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants.

**Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc...

**Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin.**

La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention.

LOT : 9MA021  
PER.: 04 2021

TEMESTA 2,5MG  
CP SEC B30

P.P.V : 29DH50



6 118000 011576

# Témosta® 2,5 mg

Lorazépam

comprimé sécable

## 1. QU'EST-CE C ET DANS QU

**ANXIOLYTIQUE**

Ce médicament

Ce médicament

lorsque celle-ci s

prévention et/ou

sevrage alcoolique.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE

### AVANT DE PRENDRE TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable dans les cas suivants : • allergie connue à cette classe de produits ou à l'un des composants du médicament, • insuffisance respiratoire grave, • syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil), • insuffisance hépatique grave, • myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable

**Mises en garde spéciales** : Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance : • durée du traitement, • dose, antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants.

**Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc...

**Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin.**

La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention.

LOT : 9MA021  
PER.: 04 2021

TEMESTA 2,5MG  
CP SEC B30

P.P.V : 29DH50



6 118000 011576