

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR IVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)

## Déclaration de Maladie : N° P19- 0015736

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **12950**

Société : **Royal air maroc**

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : **Benkiran Hassra**

Date de naissance : **01/07/1985**

Adresse : **187 bd Abdellah benkiran, résidence Moulli Zewc, apt 95**

Tél. : **0661594593**

Total des frais engagés : **334,4**

Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

**Dr SOALLI Mohamed  
Professeur de Pédiatrie  
21 Place Charles Nicolle - Casablanca  
Tél. : 05 22 26 07 20 - 06 61 14 98 84**

Date de consultation : **05/10/2019**

Nom et prénom du malade : **Benkiran Hassra** Age : **21**

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : **Affection ORL**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **34 OCT. 2019** Le : **1/1/1**

Signature de l'adhérent(e) :

**Accident siège/Ram**

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05/10/19	03		250,00	Professeur Dr MOHAMMED AL QALLI 21 Place Charles Nicolle Tél: 05 22 26 07 40 - 05 22 14 98 04
00				

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie HEDYATAK 15, Place Charles Nicolle CASABLANCA Tél: 05 22 47 56 44 / 05 22 20 20 41	05/10/19	84,40

## ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A	M	P	C	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CCEFFICIENT DES TRAVAUX
				
MONTANTS DES SOINS				
DEBUT D'EXECUTION				
FIN D'EXECUTION				
CCEFFICIENT DES TRAVAUX				
MONTANTS DES SOINS				
DATE DU DEVIS				
DATE DE L'EXECUTION				

O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE	CCEFFICIENT DES TRAVAUX
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 35533411 11433553	
	B	
MONTANTS DES SOINS		
DATE DU DEVIS		
DATE DE L'EXECUTION		

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**Dr. Mohamed SQALLI HOUSSAINI**

**Professeur de Pédiatrie**

Ancien Chef de Service de Réanimation Pédiatrique  
et de Néonatalogie Hôpital d'Enfants C.H.U. Ibn Rochd

Spécialiste des Maladies des Enfants et des Nourrissons

Pathologie Néonatale - Urgences Pédiatrique

Exploration et Traitement de l'Asthme de l'Enfant

Membre de la Société Pédiatrique de Pneumologie

et d'Allergologie

**الدكتور محمد صقلی حسیني**

**أستاذ جامعي في طب الأطفال**

**رئيس سابق لملحنة إنعاش الأطفال**

**والمولود الجديد - مستشفى ابن رشد**

**إختصاصي في أمراض الأطفال والرضيع**

**أمراض المولود الجديد المستعجلات الطبية**

**تشخيص و علاج مرض الضيقه عند الأطفال**

**عضو جمعية الأطفال المختصة في الجهاز**

**التنفسى والحساسية**

*Casablanca, le .....* الدار البيضاء، في

**05.10.2019**

**Enfant BENKIRANE Zineb**

*31, 2012*

**Age : 2 ans 2 mois**



**1 AMOXIL SIROP 250 MG (60 ML)**

1 cuillère mesure, 3 fois / jour, pendant 7 jours ( 2 Flaçons )

**2 APIRETIL SIROP (PARACETAMOL)**

Graduation à 12, 4 fois / jour, pendant 4 jours



**3 INTRALGIS SIROP (> 3 MOIS)**

Graduation à 12, 3 fois / jour, pendant 4 jours

*✓ 84.140*

Pharmacie Charles Nicolle  
19, rue Charles Nicolle  
Casablanca  
Tél: 05 22 47 56 44 / 05 22 20 20 41

Dr. SQALLI Mohamed  
Professeur de Pédiatrie  
21, Place Charles Nicolle  
Tél: 05 22 26 07 20 / 26 90 07

Résidence Pasteur : 21, Place Charles Nicolle (Face Institut Pasteur) 1er étage - N°3 - Casablanca

Tél. : 05 22 26 07 20 - 05 22 26 90 07 - Fax : 05 22 29 78 67 - GSM : 06 61 14 98 84 - E-mail : azhoum@yahoo.fr

# INTRALGIS®

Ibuprofène 20 mg/ml

s et nourrissons

20 mg  
1 ml

3 g d'ibuprofène.  
(saccharose).

150 ml.

PPU : 22,00 HT  
PER : 04/2020  
LOT : 17070

20 mg/ml  
Ibuprofène

INTRALGIS®

chez le nourrisson et l'enfant de 3 mois à 12 ans (environ 40 Kg),  
s que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

tivité proche (AINS - Aspirine), Ulcère gastro-duodénal en évolution,  
nale sévère, insuffisance cardiaque sévère non contrôlée, au-delà  
(aines d'aménorrhée), allaitement, Lupus érythémateux disséminé.

de :  
que, une sinusite chronique ou des polypes nasaux. L'administration  
notamment chez certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un anti-

- De transmettre, Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves.
  - D'antécédents de maladie, hémorragie digestive, ulcère gastro-duodénal).
  - D'insuffisance cardiaque, hépatique et rénal.
  - De varicelle. Ce médicament est déconseillé en raison d'exceptionnelles infections cutanées graves.
  - D'intolérance au fructose, syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares). Ce médicament ne doit pas être utilisé en raison de la présence de saccharose et de sorbitol.
  - De diabète ou de régime hypoglucidique, tenir compte de la teneur en saccharose (0,65 g par ml).
- NE PAS ASSOCIER AVEC UN AUTRE ANTI-INFLAMMATOIRE, NI AVEC L'ASPIRINE. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN SI VOTRE ENFANT A PRIS RECENTEMENT UN AUTRE MEDICAMENT, notamment des anticoagulants oraux, d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens y compris l'aspirine et ses dérivés, des sulfamides, des hypoglycémiants, des diurétiques, de l'héparine, du lithium, du méthotrexate à fortes doses (supérieures à 15 mg par semaine), de la ticlopidine, du clopidogrel et de la digoxine.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

### GROSSESSE

Ce médicament est destiné au nourrisson et à l'enfant. Cependant, en cas d'utilisation dans des circonstances exceptionnelles par une femme susceptible d'être enceinte, il faut rappeler les faits suivants :

PPV : 28,90 DH  
LOT : 599752  
PER : 02/2022

oite de 12 et 24,  
uspension buvable,

gsk

**Visition :** Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit à vous ou à votre enfant. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

**Que contient cette notice ?**

### 1. QU'EST-CE QUE AMOXIL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AMOXIL ?

Comment prendre AMOXIL ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver AMOXIL ?

Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE AMOXIL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

#### Qu'est-ce que AMOXIL ?

AMOXIL est un antibiotique. Le principe actif est l'amoxicilline. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines ».

#### Dans quels cas AMOXIL est-il utilisé ?

AMOXIL est utilisé pour traiter des infections causées par des bactéries dans différentes parties du corps.

AMOXIL peut également être utilisé en association à d'autres médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AMOXIL ?

Ne prenez jamais AMOXIL :

- Si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
  - Si vous avez déjà présenté une réaction allergique à un antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou de la gorge.
- Ne prenez pas AMOXIL si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

#### Avertissements et précautions

Adresssez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse (fièvre, maux de gorge, ganglions enflés et fatigue extrême)
- avez des problèmes rénaux
- N'urinez pas régulièrement

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

#### Tests sanguins et urinaires

Si vous devez effectuer :

- Des analyses d'urine (dosage du glucose) ou des analyses de sang pour explorer le fonctionnement de votre foie.
- Un dosage d'estriol (utilisé pendant la grossesse pour vérifier que le bébé se développe normalement).

Informez votre médecin ou votre pharmacien que vous prenez AMOXIL. En effet, AMOXIL peut influer sur les résultats de ces tests.

#### Enfants

Sans objet.

#### Autres médicaments et AMOXIL :

Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

• Si vous prenez de l'alloprinol (utilisé dans le traitement de la goutte) avec AMOXIL, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

• Si vous prenez du probénécide (utilisé dans le traitement de la goutte), votre médecin peut décider d'adapter votre dose d'AMOXIL.

• Si vous prenez des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (par exemple la warfarine), vous pourrez avoir besoin d'effectuer des analyses supplémentaires.

- Si vous prenez d'autres antibiotiques (tels que les tétracyclines) AMOXIL peut être moins efficace.

- Si vous prenez du méthotrexate (utilisé dans le traitement de cancer et du psoriasis sévère) AMOXIL peut provoquer une augmentation des effets indésirables.

#### AMOXIL avec des aliments et boissons :

Sans objet.

#### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### Sportifs

Sans objet.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

AMOXIL peut provoquer des effets indésirables (comme des réactions allergiques, des vertiges et des convulsions) susceptibles de réduire votre capacité à conduire. Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines à moins que vous vous sentiez bien.

#### AMOXIL comprimé dispersible contient de l'aspartam

L'aspartam (E951) est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive pour les patients ayant une maladie appelée « phénylcétonurie ».

#### AMOXIL pour suspension buvable contient :

• L'aspartam (E951) est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive pour les patients ayant une maladie appelée « phénylcétonurie ».

• Le maltodextrose est absorbée sous forme de glucose. Si votre médecin vous a informé que vous avez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

• En raison de la présence de benzoate de sodium (E221), ce médicament peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et des muqueuses et peut accroître le risque de jaunissement chez le nouveau-né.

### 3. COMMENT PRENDRE AMOXIL ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Faire dissoudre complètement chaque comprimé dans un verre d'eau et bien remuer le mélange jusqu'à ce qu'il soit homogène. Avaler immédiatement le mélange ;
- Agiter bien le flacon avant chaque utilisation et utiliser la cuillère fournie avec le flacon ;
- Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être espacées d'au moins 4 heures.

#### Posologie habituelle :

##### Enfants pesant moins de 40 kg

Toutes les posologies sont déterminées en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.

- Votre médecin vous indiquera la quantité d'AMOXIL que vous devez administrer à votre bébé ou votre enfant.

• La posologie habituelle est de 40 mg à 90 mg par kilogramme de poids corporel et par jour, à administrer en deux ou trois prises.

• La dose maximale recommandée est de 100 mg par kilogramme de poids corporel et par jour.

#### Adultes, patients âgés et enfants pesant 40 kg ou plus

La forme suspension n'est pas adaptée aux adultes et enfants de plus de 40 Kg. La posologie habituelle d'AMOXIL est de 250 mg à 500 mg trois fois par jour ou 750 mg à 1 g toutes les 12h, selon la sévérité et le type d'infection.

- Infections sévères : 750 mg à 1 g trois fois par jour.

• Infection des voies urinaires : 3 g deux fois par jour pendant un jour.

• Maladie de Lyme (infection transmise par des parasites appelés tiques) : érythème migrant isolé (phase précoce - éruption cutanée circulaire rouge ou rose) : 4 g par jour, manifestations systémiques (phase tardive - avec des symptômes plus graves ou quand la maladie est étendue à tout le corps) : jusqu'à 6 g par jour.

• Ulcère de l'estomac : 750 mg ou 1 g deux fois par jour pendant 7 jours avec d'autres antibiotiques et médicaments destinés à traiter les ulcères de l'estomac.

• Pour prévenir les infections cardiaques en cas de chirurgie. La posologie varie selon le type de chirurgie. D'autres médicaments peuvent également être administrés simultanément. Votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère pourra vous donner plus de détails.

PPV: 28,90 DH  
LOT: 599752  
PER: 02/2022



## Amoxil

500mg et 1 g comprimés dispersible

## Amoxil

125 mg, 250mg et 500mg, poudre pour

flacon de 60 ml.

### Amoxicilline

#### Dénomination du médicament

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre sécurité.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit à vous ou à votre enfant. N'en donnez pas à d'autres personnes, il pourrait leur être nocif, même si elles sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable non mentionné dans cette notice.

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que AMOXIL et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AMOXIL ?
3. Comment prendre AMOXIL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver AMOXIL ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

#### 1. QU'EST-CE QUE AMOXIL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

##### Classe pharmacothérapeutique

##### Qu'est-ce que AMOXIL ?

AMOXIL est un antibiotique. Le principe actif est l'amoxicilline, qui appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines ».

##### Dans quels cas AMOXIL est-il utilisé ?

AMOXIL est utilisé pour traiter des infections causées par des bactéries sensibles.

AMOXIL peut également être utilisé en association à d'autres médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AMOXIL ?

##### Ne prenez jamais AMOXIL :

- Si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à la pénicilline ou à d'autres médicaments contenus dans ce médicament (mentionnez-le au pharmacien).
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique à une pénicilline, y compris une éruption cutanée ou un gonflement du visage.

Ne prenez pas AMOXIL si vous êtes dans l'une des situations ci-dessus. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

##### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

• souffrez de mononucléose infectieuse (fièvre, maux de tête et fatigue extrême)

• avez des problèmes rénaux

• N'urinez pas régulièrement

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

##### Tests sanguins et urinaires

Si vous devez effectuer :

- Des analyses d'urine (dosage du glucose) ou des analyses de sang pour évaluer le fonctionnement de votre foie,
- Un dosage d'œstrogènes (utilisé pendant la grossesse pour déterminer si l'ovulation a eu lieu).

Informez votre pharmacien que vous prenez AMOXIL, car il peut influer sur les résultats de ces tests.

##### Enfants

Sans objet.

##### Autres médicaments et AMOXIL :

Informez votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou allez prendre d'autres médicaments.

• Si vous prenez de l'allopurinol (utilisé dans le traitement de l'arthrose), le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

• Si vous prenez du probénécide (utilisé dans le traitement de l'arthrose), il peut nécessiter une dose d'AMOXIL plus élevée.

• Si vous prenez des médicaments destinés à empêcher la coagulation (tels que la warfarine), vous pourriez avoir besoin d'effusions sanguines supplémentaires.

