

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## litions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## iologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## ique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## ladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



# Déclaration de Maladie

Nº P19- 0048963

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

## Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1101

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Abdelhafid Badiha Benziane


Date de naissance : 1951

Adresse :

Tél : ..... Total des frais engagés 10000 Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 31 OCT 2019

Nom et prénom du malade : PATOU 21 Age : .....  
Docteur Abdelhafid Badiha Neuro-Psychiatre 75, Rue Taha Hocine (ex-rue galliée) Tel: 0522 20.70.91/20.61.41

Lien de parenté :  Lui-même  Enfant

Nature de la maladie : SL

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : DOUCHE

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : .....  
ACCUEIL

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
31 OCT 2013	Psy		200,-	Docteur Abdellah HOUSSAINI Neuro Psychiatre 25, Rue Taha Houcine (ex: rue galilée) Tél: 0522 20.70.91/20.61.41

## EXECUTION DES ORDONNANCES

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d'explorations.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

### **(Création, remont, adjonction)**

The diagram shows a 3D grid of nodes. The vertical axis is labeled 'H' at the top and 'D' at the bottom. The horizontal and depth axes are represented by a grid of nodes. The nodes are labeled with numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. The nodes are arranged in a grid pattern, with some nodes having multiple labels (e.g., node 1 is at the top center, and node 8 is at the bottom center). The nodes are represented by small circles with labels inside.

## COEFFICIENT DES TRAVAUX

## MONTANTS DES SOINS

DATE DU  
DEVIS

الدار البيضاء، في ..... Casablanca, le ..... 31 OCT 2019

BERUZIANE NASRANIAH BADRIAH

$$38,30 \times 4 \Rightarrow 153,20$$

11 Lanoxyl 50 mg  
~~50 mg~~ 6 m

$$\text{v) } \frac{\text{Mn}^{2+} / 6}{\text{Mn}_4 \text{O}_9}$$

Taiwan

$$\overline{T} = 226,60$$

3 min

~~Docteur Abdelhalim OTARDO  
Neuro-Psychiatre  
75, Rue Taha Houcine (ex.rue galilée)  
Tél: 0522.20.70.91/20.61.41~~

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



6 118001 040391

**LAROXYL 50 mg**

(Chlorhydrate d'amitriptyline)  
20 comprimés pelliculés

BOTTU S.A.

PPV: 38 DH 30

# 50 mg, comprimé pelliculé



**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



6 118001 040391

**LAROXYL 50 mg**

(Chlorhydrate d'amitriptyline)  
20 comprimés pelliculés

BOTTU S.A.

PPV: 38 DH 30

# 50 mg, comprimé pelliculé



**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



6 118001 040391

**LAROXYL 50 mg**

(Chlorhydrate d'amitriptyline)  
20 comprimés pelliculés

BOTTU S.A.

PPV: 38 DH 30

# 50 mg, comprimé pelliculé



**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



6 118001 040391

**LAROXYL 50 mg**

(Chlorhydrate d'amitriptyline)  
20 comprimés pelliculés

BOTTU S.A.

PPV: 38 DH 30

# 50 mg, comprimé pelliculé



**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE LAROXYL 50 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

## 1. Dénomination du médicament :

ANXIOL 6 mg, comprimé quadrisécable  
(Bromazepam)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice. Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de toute autre question, si vous le souhaitez, de votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit par un autre, même en cas de symptômes identiques. Si l'un des effets indésirables devient grave, mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

## 2. Composition du médicament

### Composition :

Bromazepam.....

Excipients : Lactose, Cellulose microcristalline, Talc, Stéarate de magnésium.

Liste des Excipients à effet notoire : Lactose.

### 3. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ANXIOLYTIQUES/DERIVES DE LA BENZODIAZEPINE

### 4. Indications thérapeutiques

Ce médicament est prescrit dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

### 5. Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La posologie est strictement individuelle et il n'est pas possible de définir une dose usuelle.

- Mode et voies d'administration :

Voie orale.

Avalez ce médicament avec un verre d'eau.

- Durée du traitement :

La durée du traitement doit être aussi brève que possible et ne devrait pas dépasser 8 à 12 semaines (voir Mises en garde).

### 6. Contre-indications

Ne prenez jamais ANXIOL, comprimé quadrisécable dans les cas suivants :

- allergie connue à cette classe de produits ou à l'un des composants du médicament,
- insuffisance respiratoire grave,
- syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil),
- maladie grave du foie,
- myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### 7. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Ils sont en rapport avec la dose ingérée et la sensibilité individuelle du patient.

#### Effets indésirables neuro-psychiatriques (voir Mises en garde) : Fréquence indéterminée

• troubles de mémoire, qui peuvent survenir aux doses thérapeutiques, le risque augmentant proportionnellement à la dose,

- dépression
- troubles du comportement, modifications de la conscience, irritabilité, agressivité, agitation,
- dépendance physique et psychique, même à doses thérapeutiques avec syndrome de sevrage ou de rebond à l'arrêt du traitement,
- sensations de vertiges, maux de tête, difficulté à coordonner certains mouvements,
- confusion, baisse de vigilance voire somnolence (particulièrement chez le sujet âgé), insomnie, cauchemars, tension,
- modifications de la libido.

#### Effets indésirables cutanés : Fréquence indéterminée

• éruptions cutanées, avec ou sans démangeaisons, urticaire.

#### Effets indésirables cardiaques : Fréquence indéterminée

• insuffisance cardiaque, y compris arrêt cardiaque

#### Effets indésirables respiratoires : Fréquence indéterminée

• diminution des capacités respiratoires

#### Effets indésirables digestifs : Fréquence indéterminée

• nausées, vomissements, constipation.

#### Effets indésirables du rein et des voies urinaires : Fréquence indéterminée

• incapacité à uriner

#### Effets indésirables oculaires : Fréquence indéterminée

• vision double.

#### Effets indésirables du système immunitaire : Fréquence indéterminée

• allergies (réactions telles que gonflement, rougeur de la peau, ...), y compris réactions allergiques graves (choc anaphylactique, œdème de Quincke)

#### Effets indésirables généraux : Fréquence indéterminée

• faiblesse musculaire, fatigue.

#### Complications liées au traitement (voir Mises en garde) : Fréquence indéterminée

• chutes, fractures.

## Déclaration des effets indésirables :

La déclaration des effets indésirables suspecte importante. Elle permet une surveillance continue des médicaments.

### i. Mises en garde spéciales et précautions

Mises en garde spéciales : il une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation.

Risque de DÉPENDANCE : ce traitement peut être prolongé, un état de dépendance physique et/ou mentale peut survenir lors de la dépendance : durée du traitement.

Risque, antécédents d'autre dépendances : médicamenteuses, dépendance peut survenir même en l'absence d'information. Prenez-en à votre médecin.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition de signes tels que anxiété extrême, insomnie, troubles musculaires, diarrhée mais on peut observer des maux de tête, un engorgissement ou des picotements anormale au bras, à la jambe ou aux contacts de sens de la réalité, modification de la perception.

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être progressives. La diminution très PROGRESSIVE des doses est la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. que le traitement a été prolongé.

Malgré la diminution progressive des doses, un arrêt peut être nécessaire. produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes justifié la mise en route du traitement. Des troubles de mémoire ainsi que des altérations susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise peuvent être associés à un sommeil. Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions : insomnie, cauchemars, agitation, désinhibition, amnésie, hallucinations, modifications des comportements potentiellement dangereux. entourage, ainsi que des troubles du comportement. réactions sont plus susceptibles de survenir chez les personnes âgées. Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent, contactez votre médecin.

Les benzodiazépines sont produits apparentés aux barbituriques. L'effet de sommeil est favorisé par l'âge, en raison du risque de somnolence et/ou de dépendance. L'utilisation simultanée de bromazepam et d'alcool peut entraîner une dépendance.

Précautions d'emploi : L'utilisation simultanée de bromazepam et d'alcool peut entraîner une dépendance.

La durée du traitement doit être aussi courte que possible. Des troubles de mémoire ainsi que des altérations susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise peuvent être associés à un sommeil.

Ce médicament peut provoquer des réactions : insomnie, cauchemars, agitation, désinhibition, amnésie, hallucinations, modifications des comportements potentiellement dangereux. entourage, ainsi que des troubles du comportement. réactions sont plus susceptibles de survenir chez les personnes âgées. Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent, contactez votre médecin.

Les benzodiazépines sont produits apparentés aux barbituriques. L'effet de sommeil est favorisé par l'âge, en raison du risque de somnolence et/ou de dépendance. L'utilisation simultanée de bromazepam et d'alcool peut entraîner une dépendance.

Précautions d'emploi : L'utilisation simultanée de bromazepam et d'alcool peut entraîner une dépendance.

La durée du traitement doit être aussi courte que possible. Des troubles de mémoire ainsi que des altérations susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise peuvent être associés à un sommeil.

Ce médicament peut provoquer des réactions : insomnie, cauchemars, agitation, désinhibition, amnésie, hallucinations, modifications des comportements potentiellement dangereux. entourage, ainsi que des troubles du comportement. réactions sont plus susceptibles de survenir chez les personnes âgées. Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent, contactez votre médecin.

Le sommeil peut être dérégulé par l'effet de sommeil et/ou de dépendance. L'utilisation simultanée de bromazepam et d'alcool peut entraîner une dépendance.

Précautions d'emploi : L'utilisation simultanée de bromazepam et d'alcool peut entraîner une dépendance.

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical régulier : insuffisance rénale, de maladie chronique et/ou de dépendance. ainsi que chez les enfants et les sujets âgés. Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez les personnes âgées, l'anxiété associée à la dépression, il ne doit pas être évalué pour son propre compte avec persistance.

La prise d'alcool est formellement déconseillée. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mentions relatives aux excipients à effet notoire : Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à ce médicament, ne prenez pas ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée au galactosé, un déficit en lactase de Lapp ou un déficit en lactase de galactose (maladies héréditaires rares).

### 9. Interactions

- Interactions avec d'autres médicaments :

#### Autres médicaments et ANXIOL, comprimé quadrisécable

Associations déconseillées : • Alcool (boissons alcoolisées)

Associations à prendre en compte : • dérivés morphiniques (analgesiques, antitussifs, buprénorphine)

• antipsychotiques (médicaments du système nerveux central)

• barbituriques (médicaments du système nerveux central)

## 1. Dénomination du médicament :

ANXIOL 6 mg, comprimé quadrisécable  
(Bromazepam)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice. Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de toute autre question, si vous le souhaitez, de votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit par un autre, même en cas de symptômes identiques. Si l'un des effets indésirables devient grave, mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

## 2. Composition du médicament

### Composition :

Bromazepam.....

Excipients : Lactose, Cellulose microcristalline, Talc, Stéarate de magnésium.

Liste des Excipients à effet notoire : Lactose.

### 3. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ANXIOLYTIQUES/DERIVES DE LA BENZODIAZEPINE

### 4. Indications thérapeutiques

Ce médicament est prescrit dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

### 5. Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La posologie est strictement individuelle et il n'est pas possible de définir une dose usuelle.

- Mode et voies d'administration :

Voie orale.

Avalez ce médicament avec un verre d'eau.

- Durée du traitement :

La durée du traitement doit être aussi brève que possible et ne devrait pas dépasser 8 à 12 semaines (voir Mises en garde).

### 6. Contre-indications

Ne prenez jamais ANXIOL, comprimé quadrisécable dans les cas suivants :

- allergie connue à cette classe de produits ou à l'un des composants du médicament,
- insuffisance respiratoire grave,
- syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil),
- maladie grave du foie,
- myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### 7. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Ils sont en rapport avec la dose ingérée et la sensibilité individuelle du patient.

#### Effets indésirables neuro-psychiatriques (voir Mises en garde) : Fréquence indéterminée

• troubles de mémoire, qui peuvent survenir aux doses thérapeutiques, le risque augmentant proportionnellement à la dose,

- dépression
- troubles du comportement, modifications de la conscience, irritabilité, agressivité, agitation,
- dépendance physique et psychique, même à doses thérapeutiques avec syndrome de sevrage ou de rebond à l'arrêt du traitement,
- sensations de vertiges, maux de tête, difficulté à coordonner certains mouvements,
- confusion, baisse de vigilance voire somnolence (particulièrement chez le sujet âgé), insomnie, cauchemars, tension,
- modifications de la libido.

#### Effets indésirables cutanés : Fréquence indéterminée

• éruptions cutanées, avec ou sans démangeaisons, urticaire.

#### Effets indésirables cardiaques : Fréquence indéterminée

• insuffisance cardiaque, y compris arrêt cardiaque

#### Effets indésirables respiratoires : Fréquence indéterminée

• diminution des capacités respiratoires

#### Effets indésirables digestifs : Fréquence indéterminée

• nausées, vomissements, constipation.

#### Effets indésirables du rein et des voies urinaires : Fréquence indéterminée

• incapacité à uriner

#### Effets indésirables oculaires : Fréquence indéterminée

• vision double.

#### Effets indésirables du système immunitaire : Fréquence indéterminée

• allergies (réactions telles que gonflement, rougeur de la peau, ...), y compris réactions allergiques graves (choc anaphylactique, œdème de Quincke)

#### Effets indésirables généraux : Fréquence indéterminée

• faiblesse musculaire, fatigue.

#### Complications liées au traitement (voir Mises en garde) : Fréquence indéterminée

• chutes, fractures.

## Déclaration des effets indésirables :

La déclaration des effets indésirables suspecte importante. Elle permet une surveillance continue des médicaments.

### i. Mises en garde spéciales et précautions

Mises en garde spéciales : il une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation.

Risque de DÉPENDANCE : ce traitement peut être prolongé, un état de dépendance physique et/ou mentale peut survenir lors de la dépendance : durée du traitement,

• dose, antécédents d'autre dépendances : médicament, dépendance peut survenir même en l'absence d'information. Prenez-en à votre médecin.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition de signes tels que anxiété extrême, insomnie, troubles musculaires, diarrhée mais on peut observer des maux de tête, un engorgissement ou des picotements anormale au bras, à la jambe ou aux contacts de sens de la réalité, modification de la perception.

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être progressives. La diminution très PROGRESSIVE des doses est la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. que le traitement a été prolongé.

Malgré la diminution progressive des doses, un arrêt peut être nécessaire. produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes justifié la mise en route du traitement. Des troubles de mémoire ainsi que des altérations susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise peuvent être associés à un sommeil. Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions : insomnie, cauchemars, agitation, désinhibition, amnésie, hallucinations, modifications des comportements potentiellement dangereux. entourage, ainsi que des troubles du comportement. réactions sont plus susceptibles de survenir chez les personnes âgées. Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent, contactez votre médecin.

Les benzodiazépines sont produits apparentés aux barbituriques. L'effet de sommeil est favorisé par l'âge, en raison du risque de somnolence et/ou de dépendance. L'utilisation simultanée de bromazepam et d'alcool peut entraîner une dépendance.

Précautions d'emploi : L'utilisation simultanée de bromazepam et d'alcool peut entraîner une dépendance.

La durée du traitement doit être aussi courte que possible. Des troubles de mémoire ainsi que des altérations susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise peuvent être associés à un sommeil.

Ce médicament peut provoquer des réactions : insomnie, cauchemars, agitation, désinhibition, amnésie, hallucinations, modifications des comportements potentiellement dangereux. entourage, ainsi que des troubles du comportement. réactions sont plus susceptibles de survenir chez les personnes âgées. Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent, contactez votre médecin.

Les benzodiazépines sont produits apparentés aux barbituriques. L'effet de sommeil est favorisé par l'âge, en raison du risque de somnolence et/ou de dépendance. L'utilisation simultanée de bromazepam et d'alcool peut entraîner une dépendance.

Précautions d'emploi : L'utilisation simultanée de bromazepam et d'alcool peut entraîner une dépendance.

La durée du traitement doit être aussi courte que possible. Des troubles de mémoire ainsi que des altérations susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise peuvent être associés à un sommeil.

Ce médicament peut provoquer des réactions : insomnie, cauchemars, agitation, désinhibition, amnésie, hallucinations, modifications des comportements potentiellement dangereux. entourage, ainsi que des troubles du comportement. réactions sont plus susceptibles de survenir chez les personnes âgées. Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent, contactez votre médecin.

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical régulier : insuffisance rénale, de maladie chronique ou d'âge, ainsi que chez les enfants et les sujets âgés.

Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez les personnes âgées, l'anxiété associée à la dépression, il ne doit pas être évalué pour son propre compte avec persistance.

La prise d'alcool est formellement déconseillée. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mentions relatives aux excipients à effet notoire : Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à ce médicament, ne prenez pas ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée au galactosé, un déficit en lactase de Lapp ou un déficit en lactose (maladies héréditaires rares).

### 9. Interactions

- Interactions avec d'autres médicaments :

#### Autres médicaments et ANXIOL, comprimé quadrisécable

Associations déconseillées :

• Alcool (boissons alcoolisées) et médicaments contenant de l'alcool.

Associations à prendre en compte :

• dérivés morphiniques (analgesiques, antitussifs, buprénorphine)

• antipsychotiques (médicaments du système nerveux central)

• barbituriques (médicaments du système nerveux central)