

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET ÉVITER LES REJETS

## tions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## ladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

## Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2798

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : CHAKIB KAMAL

Date de naissance : 20/05/1954

Adresse : 94 Rue el Fourate n°5 MAArif

Tél. : 05 22 23 61 76

Total des frais engagés :

Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur TAGNAOUTI Brahim  
Médecine Générale  
70, Rue de Normandie Maârif  
Tél. : 05 22 25 50 32

Date de consultation : 04/11/19

Nom et prénom du malade : CHAKIB KAMAL

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Enfant

Nature de la maladie :

Docteur TAGNAOUTI Brahim  
Médecine Générale  
70, Rue de Normandie Maârif  
Tél. : 05 22 25 50 32

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 03/11/2019

Signature de l'adhérent(e) :

ES

**MUPRAS**  
ACCUEIL

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
			€ 1 200,00	Docteur TAGNAOUT BRAHIM Médecine Générale Rue des Normandie Marif Tel: 05 22 25 50 32

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 <b>Mme CHAAABI</b> Mme Nouhass El Nahoui, Maârif 09 22 - Casablanca	04/11/19	554,80

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553
	B

### (Création, remont, adjonction)

ctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECU

Dr. TAGNAOUTI Brahim

Diplômé de la Faculté de Médecine  
de Bordeaux  
MEDECINE GENERALE

70, Rue de Normandie - Maârif  
CASABLANCA

Tél. : 05 22 25 59 32

الدكتور إبراهيم التناوتي

خريج كلية الطب ببوردو  
الطب العام

70، زنقة نورماندي - المعاريف

الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 25 59 32

Casablanca, le ..... 24/11/19 ..... الدار البيضاء، في :

Mr Chalib Kamal

138,20

Augmentin 500 AS

38,80

Melaxol  $80 \times 20$  AS

58,40

Solopred 60  $100 \times 30$  AS

136,20

Nasone  $30 \times 10$  le male

69,00

Doxi + Vo  $20 \times 20$  AS

114,70

Inexum 20/14 AS

Docteur TAGNAOUTI Brahim  
Médecine Générale  
70, Rue de Normandie Maârif  
Tél. : 05 22 25 59 32

صيدلية شعبية  
Pharmacie CHAABI  
Mme CHAABI 1  
Rue Nouhass El Nahouf, Maârif  
Tél: 0522 99 09 22 - Casablanca

T = 554,80

# AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose

## AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé Amoxicilline/Acide clavulanique

### Dénomination du médicament

Veuillez lire attentivement l'entièrealité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

PPV : 138,30 DH  
LOT : 593792  
PER : 09/20



idez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ne le nommez pas identiques, cela pourrait entraîner un effet indésirable non désiré.

SE ?  
TENRE AUGMENTIN ?

ISE ?

des infections. Il contient deux actifs. L'amoxicilline appartient à celles qui sont détruite efficacement par cette inactivation.

es sensibles et/ou après un traitement, notamment dans certaines infections. Elles peuvent être multiples et/ou

TENRE AUGMENTIN ?

## CTR LES DOSES PRESCRITES

### te I. Uniquement sur ordonnance

#### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose : Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé : sans objet.

Ne prenez jamais AUGMENTIN :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans AUGMENTIN (dont la liste est fournie à la rubrique 6).
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou.
- Si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

→ Ne prenez pas AUGMENTIN si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

Faites attention avec AUGMENTIN :

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse,
- êtes traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection. Selon les résultats, il pourra vous prescrire un dosage différent de AUGMENTIN ou un autre médicament.

Reactions nécessitant une attention particulière

AUGMENTIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Lorsque vous prenez AUGMENTIN, vous devez surveiller certains symptômes afin de réduire les risques. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière », à la rubrique 4.

Tests sanguins et urinaires

Si vous effectuez des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmier (ier) que vous prenez AUGMENTIN. En effet, AUGMENTIN peut influer sur les résultats de ces types de tests.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, parlez-en à votre médecin ou à

votre pharmacien. Cela inclut les médicaments vendus sans ordonnance, et aussi les produits à base de plantes.

Si vous prenez de l'allopurinol (en traitement de la goutte) avec AUGMENTIN, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

Si vous prenez du probénécide (en traitement de la goutte), votre médecin peut décider d'ajuster votre dose de AUGMENTIN.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine) sont pris avec AUGMENTIN, des analyses sanguines supplémentaires peuvent être requises.

AUGMENTIN peut influer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter le cancer ou les maladies rhumatismales).

AUGMENTIN peut influer sur l'action du mycophénolate mofétil (traitement pour prévenir le rejet de greffe d'organes).

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou s'il est possible que vous le soyez, ou si vous allaitez, vous devez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un quelconque médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

AUGMENTIN peut provoquer des effets indésirables susceptibles de réduire la capacité à conduire. Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si vous ne vous sentez pas bien.

Informations importantes concernant certains composants de AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose :

- AUGMENTIN contient de l'Aspartam (E951), qui est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive chez les enfants nés avec une maladie appelée « phénylkétonurie ».
- AUGMENTIN contient de la maltodextrine (glucose). Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé : sans objet.

#### 3. COMMENT PRENDRE AUGMENTIN ?

Instructions pour un bon usage

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Adultes et enfants de 40 kg et plus

- Dosage habituelle : 1 sachet 1 g/125 mg ou 2 comprimés 500 mg/62,5 mg trois fois par jour
- Dosage inférieure : 1 sachet 1 g/125 mg ou 2 comprimés 500 mg/62,5 mg deux fois par jour

Enfants pesant moins de 40 kg

Les enfants âgés de 6 ans ou moins doivent de préférence être traités avec AUGMENTIN en suspension buvable ou en sachet 500 mg/62,5 mg.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien si vous devez donner des comprimés d'AUGMENTIN à des enfants pesant moins de 40 kg.

Patients souffrant de problèmes rénaux et hépatiques

- En cas de problèmes rénaux, une adaptation de la posologie peut être nécessaire. Le médecin pourra prescrire un dosage différent ou un autre médicament.
- En cas de problèmes au foie, des analyses de sang plus fréquentes pourront être nécessaires afin de vérifier le fonctionnement de votre foie.

Comme prendre AUGMENTIN ?

- AUGMENTIN 1 g/125 mg sachets : Juste avant la prise de AUGMENTIN, ouvrez le sachet et mélangez son contenu dans un demi-verre d'eau.

Avez le mélange au début d'un repas ou un peu avant.

AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg adulte comprimés : Avez les comprimés entiers avec un verre d'eau au début d'un repas ou un peu avant.

• Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être espacées de au moins 4 heures. Ne prenez pas 2 doses en 1 heure.

• Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si vous ne vous sentez pas bien.

• Ne prenez pas AUGMENTIN pendant plus de 2 semaines. Si vos symptômes persistent, consultez de nouveau un médecin.

Si vous avez pris plus de AUGMENTIN que vous n'auriez dû :

La prise d'une quantité excessive de AUGMENTIN peut entraîner des maux de ventre (nausées, vomissements ou diarrhée) ou des convulsions. Parlez-en à votre médecin le plus tôt possible. Montez la boîte de médicament au médecin.

Si vous oubliez de prendre AUGMENTIN :

Si vous avez oublié une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Attendez ensuite environ 4 heures avant de prendre la dose suivante.

Si vous arrêtez de prendre AUGMENTIN ?

Vous devez continuer de prendre AUGMENTIN jusqu'à la fin du traitement, même si vous vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certaines bactéries devaient survivre, elles pourraient être à l'origine d'une réapparition de l'infection.

38,80

PPV (DH) :

LOT N° :

UT. AV.:

موکسول

أمير موكسول

بدون سكر

NASONEX 50 µg/dose

*Suspension pour pulvérisation nasale*

Flacon de 120 doses

P.P.V: 136,20 DH

Distribué par MSD Maroc

## INFORMATION DE L'UTILISATEUR

OFR219268IN

1/2

**50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale**

**Flacon de mométasone anhydre**

### **l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE NASONEX 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER NASONEX 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale ?
3. COMMENT UTILISER NASONEX 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELLES ?



INEXIUM®  
esomeprazole  
20 mg  
comprimé gastro-résistant

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant  
 - Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.  
 - Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien.  
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne ayant des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.  
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez quelque chose de suspect, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Dans cette notice :**

1. Qu'est-ce que INEXIUM® 20 mg, comprimé gastro-résistant et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INEXIUM® 20 mg, comprimé gastro-résistant ?
3. Comment prendre INEXIUM® 20 mg, comprimé gastro-résistant ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver INEXIUM® 20 mg, comprimé gastro-résistant ?
6. Informations supplémentaires.

**1. QU'EST-CE QUE INEXIUM® 20 mg, comprimé gastro-résistant ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : INHIBITEUR DE LA POMPE A PROTONS.

INEXIUM® est utilisé dans :

- le traitement de l'œsophagite érosive par reflux (inflammation de l'œsophage),
- la prévention des rechutes de certaines œsophagites,
- le traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (brûlures et remontées acides), le traitement de l'ulcère du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*,
- le traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS),
- la prévention des ulcères de l'estomac et du duodénum associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE INEXIUM® 20 mg, comprimé gastro-résistant ?**

Il est particulièrement important d'informer votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, même ceux sans prescription médicale.

**Ne prenez jamais INEXIUM® 20 mg, comprimé gastro-résistant :**

افراض مصودة بالمعذلة

لسم و عنوان ملك الازن بالمنسوبي

AstraZeneca

1, place Renault

92844 RUEIL-MALMAISON CEDEX

لسم و عنوان المصنع

AstraZeneca AB

S-151 85 Sodertalje - SUEDE

اسم و عنوان المعني و المحرر

Recipharm Monts

18, rue de Montbazin

37260 Monts

عن طريق الفم

احظ هذا الدواء في مكان بعيد عن متناول أيدي الأطفال وعن مرأة

قبل الاستعمال اقرأ بيان النشرة الالامية.

**SYNTHEMEDIC**

22-24 Rue Zoubeir Ibnou

El Aouam 20500 Casablanca

**P.P.V : 114,10**

Informations importantes concernant certains composants de INEXIUM® 20 mg, comprimé gastro-résistant : saccharose.


**3. COMMENT PRENDRE INEXIUM® 20 mg, comprimé gastro-résistant ?**

Votre médecin vous dira combien de comprimés vous devez prendre et quand vous devez les prendre. Le dosage des comprimés que vous prenez et la durée du traitement dépendront de l'importance des symptômes dont vous souffrez.


Vous pouvez prendre vos comprimés au cours d'un repas ou à jeun. Les comprimés ne doivent pas être mâchés ni croqués.



Ils doivent être avalés entiers avec un demi-verre d'eau.



Si vous avez des difficultés pour avaler, les comprimés peuvent aussi être mis dans un demi-verre d'eau non gazeuse. Aucun autre liquide ne doit être utilisé.



Remuez jusqu'à ce que les comprimés se désintègrent. Vous pouvez alors boire la solution contenant des petits granules immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours avant de boire. Rincez ensuite le verre.



# Solupred® 20 mg

Prednisolone

Comprimé effervescent

sanofi aventis

Intégralité de cette  
cament.

rriez avoir besoin

s, si vous avez un  
rmations à votre

ersonnellement  
quelqu'un d'autre,  
identiques, cela

58,40

de tuberculose), d'insuffisance hépatique,  
d'insuffisance rénale, d'ostéoporose et de  
myasthénie grave (maladie des muscles avec  
fatigue musculaire).

Prévenir votre médecin en cas de séjour dans  
les régions tropicale, subtropicale ou le sud de  
l'Europe, en raison du risque de maladie  
parasitaire.

La prise de ce médicament en association avec  
le sultopride (un médicament agissant sur le  
système nerveux central) ou avec un vaccin vivant  
atténué est à éviter (voir rubrique "interactions  
médicamenteuses et autres interactions").

## PENDANT ET APRES LE TRAITEMENT :

Eviter le contact avec les sujets atteints de varicelle  
ou de rougeole.

En cas de traitement prolongé, ne jamais arrêter  
brutalement le traitement mais suivre les  
recommandations de votre médecin pour la  
diminution des doses.

Sous traitement et au cours de l'année suivant  
l'arrêt du traitement, prévenir le médecin de  
la prise de corticoïde, en cas d'intervention  
chirurgicale ou de situation de stress (fièvre,  
maladie).

## Solupred® 20mg

IENT

Métaulfobénozoate de prednisolone et de sodium  
quantité correspondant en prednisolone à ... 20 mg.

Excipients : Acide tartrique, acide citrique  
anhydre, bicarbonate de sodium, benzoate de  
lithium, citron arôme naturel, saccharinate de  
sodium, silicone émulsion anti-mousse.

Chaque comprimé contient 50,80 mg de sodium.

### Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé effervescent. (Flacon (verre) de 20).



**Comprimé**  
Voie orale

# DociVox

comprimé à sucer



## FORMES ET PRESENTATIONS

DociVox comprimé à sucer :  
-Boîte de 10 - Boîte de 20

## PROPRIETES :

DociVox est une association synergique de propolis, phytoactif pour la gorge et les voies respiratoires : • Apaise et dégage les toux • Renforce les défenses naturelles.

- Propolis : la sphère d'action privilégiée de la propolis concerne très rapidement de nombreuses affections couramment rencontrées.
- Eucalyptus : remarquable décongestionnant respiratoire.
- Échinacée : utilisée pour renforcer les défenses naturelles de la grippe ou le refroidissement (syndrome grippal).

## UTILISATIONS :

DociVox comprimé à sucer est spécialement formulé pour protéger la muqueuse et atténuer les symptômes : -Enrouements passagers. -Maux de gorge en cas de toux sèche d'irritation ou d'allergie. DociVox procure une sensation de fraîcheur agréable et durable (goût original menthe, miel et citron).

## POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

1 comprimé à sucer 3 fois par jour.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la ruche ou à l'un des constituants.

Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

## COMPOSITION :

propolis 80 mg, extrait d'eucalyptus (eucalyptus globulus) 50 mg, extrait sec d'échinacée (echinacea purpurea) 50 mg, extrait de gingembre (zingiber officinalis) 12 mg, acide ascorbique 60 mg, sorbitol, poudre miel, stéarate de magnésium végétal, silice colloïdale, thaumatine, sucralose, acésulfame potassium, aspartame, arôme citron, menthol.

Autorisation ministère de la santé n° DA 20171612028DMP/20UCAv1

مختبرات ديفا للصيدلة  
ج. واجدي صيدلي مسؤول



Laboratoires Deva Pharmaceutique  
J.OUAJDI Pharmacien Responsable