

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com  
 0 Prise en charge : pec@mupras.com  
 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS - Mutuelle Régionale des Adhérents - Avenue Hassan II - Agence Mohamed Ben Youssef - Bureau 100 - Casablanca - Maroc - Tél. : +212 33 25 46 00 - Fax : +212 32 78 18 2000 - mupras.ma



Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

## Déclaration de Maladie

N° 10482 N° W19-496044

Couic

### Maladie

### Dentaire

### Optique

### Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 1811 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Mohammed Youzouli

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0669429656

Total des frais engagés : Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade : MÁLIKA CHIHAB Age:

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie :

MUPRAS

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

02 DEC. 2011

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

ACCUEIL

### VOLET ADHÉRENT

Déclaration de maladie

N° W19-496044

Remplissez ce volet, découpez le et conservez-le.  
 Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :





Date de dépôt :

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

~~SEND TO DRONES~~ Some data has already been output, can't send

**SANTE ET DROITS DES SOIGNANTS**  
Présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

raphies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODP.

SOINS DENTAIRES		Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient	Coefficient des travaux
					
					<b>Montant des soins</b> 
					<b>Début d'exécution</b> 
					<b>Fin d'exécution</b> 
<b>O.D.F.</b> Prothèses dentaires		Détermination du coefficient masticatoire			<b>Coefficient des travaux</b> 
		H 25533412 00000000 00000000 35533411	G 21433552 00000000 00000000 11433553		
		(Création, Remont, adjonction) Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession			<b>Montant des soins</b> 
					<b>Date du devis</b> 
					<b>Fin de l'exécution</b> 
Visa et cachet du praticien attestant le devis		Visa et cachet du praticien attestant l'exécution			
VOLET ADHERENT		NOM : 			Mle : 
DECLARATION N° : 					
Date de Dépot : 	Montant engagé : 	Nbre de pièces jointes : 			
<b>Durée de validité de cette feuille est de (3) trois mois</b>					
Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle					

MIFRAS Mutuelle de Prévoyance d'Actions Sociales de Royal Air Maroc		DATE DE DEPOT		
<b>A REMPLIR PAR L'ADHERENT</b>		<b>Mle :</b>	Signature de l'adhérent Signature de l'adhérent	
Nom & Prénom .....				
Fonction : .....	Phones.....			
eMail .....				
<b>MEDECIN</b>	Prénom du patient			
Adhérent <input type="checkbox"/>	Conjoint <input type="checkbox"/>	Enfant <input type="checkbox"/>	Age .....	
Nature de la maladie		Date : <u>18/10/2019</u> Date 1ère visite .....		
<i>Diabète type 2</i>				
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances				
Nature des actes	Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires		
<i>C</i>	<i>1</i>	<i>250.00</i>		
<b>PHARMACIE</b>	Date : <u>18/10/2019</u>			
Montant de la facture				
<i>Pharmacie AL HIDAYA</i> <i>Mme Naima BENI</i> <i>Dr. Asmae SIDI</i> <i>Address: 10 Rue Jakarta et Lieutenant Saidi</i> <i>Etage: 2nd Floor - Residence Saidi</i>				
ANALYSES - RADIOGRAPHIES Date : <u>18/10/19</u>				
Désignation des Coefficients	Montant détaillé des Honoraires			
<i>B 350</i>	<i>350 D.H</i>			
AUXILIAIRES MEDICAUX Date :				
Nombre		Montant détaillé des Honoraires		
AM	PC	IM	IV	

# LABORATOIRE ABDELMOUMEN D'ANALYSES MEDICALES

ICE : 001636557000050  
IF:40122309

OUJDA  
Taxe professionnelle:10837042

Oujda le 11 octobre 2019

Mme CHIHAB MALIKA

FACTURE N°	68052
------------	-------

## Analyses :

Clearance à la créatinine -----	B	50
Triglycérides -----	B	50
Acide urique -----	B	30
Hémoglobine glycosylée HBA1C -----	B	100
Examen Cytobactériologique des urines -----	B	120

## Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5
-----------	----	-----

TOTAL DOSSIER 350,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Trois Cent Cinqante Dirhams

LABORATOIRE ABDELMOUMEN  
MEDICAL D'ANALYSES  
Dr. Asmaa JAMJOUN  
Angle Rue Jakart et Lieutenant  
Belhacine, Résidence Saidi  
1er Etage. Appart 2 - Oujda



**CABINET EL MEKAOUI**  
Endocrinologie & Diabétologie

الدكتورة المكاوي صفاء

Docteur EL MEKKAOUI Safae  
أخصائية في أمراض الغدد والسكري وأمراض الأيض  
Spécialiste en endocrinologie, diabétologie  
et maladies métaboliques

Oujda Le : 18/05/2019 ..... وجدة في :

Chihab Malika

$$2,20 \times 3 = 27,60$$

- Aneul 3ug

1g astéri a jen 300ir

- Januet 50 ug / 1000 cyp

$31,30 \times 3 = 93,90$  1g aidi, 1g de 100

- Zylorin 200 cyp

1g astéri après 1g de 300ir

Coveram 5ug / 5 cyp

1g astéri apres 1g de 300ir

196,18 Sepren 500 cyp

x 215 kg 1000 cyp 1000 cyp

208 Pharmacie AL HIDAYA  
24,000 Dhs  
Avenue Naima BENILALI  
Boulevard Youssef ibn tachafine  
N°52 - 06200 Oujda  
Tél. : 05 36 70 77 75

208 Pharmacie AL HIDAYA  
24,000 Dhs  
Avenue Naima BENILALI  
Boulevard Youssef ibn tachafine  
N°52 - 06200 Oujda  
Tél. : 05 36 70 77 75

Pharmacie AL HIDAYA  
Mme Naima BENILALI  
Docteur Safae  
1 Rue Senebel  
Tél. : 05 36 70 77 75  
OUJDA  
INPE : 2005455

208 Pharmacie AL HIDAYA  
24,000 Dhs  
Avenue Naima BENILALI  
Boulevard Youssef ibn tachafine  
N°52 - 06200 Oujda  
Tél. : 05 36 70 77 75

208 Pharmacie AL HIDAYA  
24,000 Dhs  
Avenue Naima BENILALI  
Boulevard Youssef ibn tachafine  
N°52 - 06200 Oujda  
Tél. : 05 36 70 77 75

شارع يوسف بن تاشفين، بقامة بين تاشفدين رقم 5، اطباقي الأول شقة رقم 7  
Boulevard Youssef ibn tachafine, N5 Résidence ibn tachafine, 1er étage N7

Tél : 05 36 70 77 75

# Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimépiride  
Comprimé

SANOFI

## 1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

### Dans quel cas AMAREL, comprimé est-il utilisé ?

AMAREL, comprimé est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls les taux de sucre dans le sang.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AMAREL,

#### COMPRIME ?

Ne prenez jam-

- si vous êtes à

(médicaments

glibenclamide

bactériennes, i-

contenus dans

- si vous avez i-

- en cas de dé-

votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains des

signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et

raideur musculaire) ;

- en cas de coma diabétique ;

- si vous avez une maladie grave des reins ;

- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

#### Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.

- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

#### Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux du sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

- modification du régime alimentaire ;
- prise de plus d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;
- fonction rénale diminuée ;
- maladie grave du foie ;
- si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysaire ou des glandes surrenales) ;
- consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;
- prise de certains autres médicaments (voir «Prise d'autres médicaments») ;
- si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement.

Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- faim intense, maux de tête, nausées, vomissement, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensitifs, vertiges, sensation de faiblesse.
- les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs intenses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines (angine de poitrine et troubles de rythme cardiaque).

Si votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter un état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de soi, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

#### Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre : par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou thé sucré. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces.

Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

#### Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

#### Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose d'AMAREL, comprimé si vous prenez d'autres médicaments. En effet, ceux-ci peuvent diminuer ou augmenter l'effet d'AMAREL, comprimé sur votre taux de sucre dans le sang.

L'effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être augmenté par les médicaments suivants et entraîner un risque d'hypoglycémie :

- autres médicaments pour traiter le diabète (tels que l'insuline ou la metformine)
- médicaments pour traiter la douleur ou l'inflammation (phénylbutazone, azopropazone, oxyphenbutazone, aspirine) ;
- médicaments pour traiter les infections urinaires (tels que certains sulfamides antibactériens à longue durée d'action) ;
- médicaments pour traiter les infections bactériennes et fongiques (tétracyclines, chloramphénicol, flucanaçole, miconazole, les quinolones, clarithromycine) ;
- médicaments pour empêcher la coagulation du sang (antivitamines K de type dérivés coumariniques tels que la warfarine) ;
- médicaments favorisant le développement musculaire (anabolisants) ;
- médicaments utilisés pour la thérapie de substitution par hormones sexuelles masculines ;

# Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimépiride  
Comprimé

SANOFI

## 1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

### Dans quel cas AMAREL, comprimé est-il utilisé ?

AMAREL, comprimé est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls les taux de sucre dans le sang.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AMAREL,

#### COMPRIME ?

Ne prenez jam-

- si vous êtes à

(médicaments

glibenclamide

bactériennes, i-

contenus dans

- si vous avez i-

- en cas de dé-

votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains des

signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et

raideur musculaire) ;

- en cas de coma diabétique ;

- si vous avez une maladie grave des reins ;

- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

#### Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.

- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

#### Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux du sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

- modification du régime alimentaire ;
- prise de plus d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;
- fonction rénale diminuée ;
- maladie grave du foie ;
- si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysaire ou des glandes surrenales) ;
- consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;
- prise de certains autres médicaments (voir «Prise d'autres médicaments») ;
- si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement.

Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- faim intense, maux de tête, nausées, vomissement, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensitifs, vertiges, sensation de faiblesse.
- les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs intenses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines (angine de poitrine et troubles de rythme cardiaque).

Si votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter un état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de soi, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

#### Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre : par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou thé sucré. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces.

Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

#### Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

#### Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose d'AMAREL, comprimé si vous prenez d'autres médicaments. En effet, ceux-ci peuvent diminuer ou augmenter l'effet d'AMAREL, comprimé sur votre taux de sucre dans le sang.

L'effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être augmenté par les médicaments suivants et entraîner un risque d'hypoglycémie :

- autres médicaments pour traiter le diabète (tels que l'insuline ou la metformine)
- médicaments pour traiter la douleur ou l'inflammation (phénylbutazone, azopropazone, oxyphenbutazone, aspirine) ;
- médicaments pour traiter les infections urinaires (tels que certains sulfamides antibactériens à longue durée d'action) ;
- médicaments pour traiter les infections bactériennes et fongiques (tétracyclines, chloramphénicol, flucanaçole, miconazole, les quinolones, clarithromycine) ;
- médicaments pour empêcher la coagulation du sang (antivitamines K de type dérivés coumariniques tels que la warfarine) ;
- médicaments favorisant le développement musculaire (anabolisants) ;
- médicaments utilisés pour la thérapie de substitution par hormones sexuelles masculines ;

# Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimépiride  
Comprimé

SANOFI

## 1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

### Dans quel cas AMAREL, comprimé est-il utilisé ?

AMAREL, comprimé est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls les taux de sucre dans le sang.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AMAREL,

#### COMPRIME ?

Ne prenez jam-

- si vous êtes à

(médicaments

glibenclamide

bactériennes, i-

contenus dans

- si vous avez i-

- en cas de dé-

votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains des

signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et

raideur musculaire) ;

- en cas de coma diabétique ;

- si vous avez une maladie grave des reins ;

- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

#### Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.

- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

#### Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux du sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

- modification du régime alimentaire ;
- prise de plus d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;
- fonction rénale diminuée ;
- maladie grave du foie ;
- si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysaire ou des glandes surrenales) ;
- consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;
- prise de certains autres médicaments (voir «Prise d'autres médicaments») ;
- si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement.

Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- faim intense, maux de tête, nausées, vomissement, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensitifs, vertiges, sensation de faiblesse.
- les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs intenses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines (angine de poitrine et troubles de rythme cardiaque).

Si votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter un état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de soi, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

#### Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre : par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou thé sucré. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces.

Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

#### Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

#### Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose d'AMAREL, comprimé si vous prenez d'autres médicaments. En effet, ceux-ci peuvent diminuer ou augmenter l'effet d'AMAREL, comprimé sur votre taux de sucre dans le sang.

L'effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être augmenté par les médicaments suivants et entraîner un risque d'hypoglycémie :

- autres médicaments pour traiter le diabète (tels que l'insuline ou la metformine)
- médicaments pour traiter la douleur ou l'inflammation (phénylbutazone, azopropazone, oxyphenbutazone, aspirine) ;
- médicaments pour traiter les infections urinaires (tels que certains sulfamides antibactériens à longue durée d'action) ;
- médicaments pour traiter les infections bactériennes et fongiques (tétracyclines, chloramphénicol, flucanaçole, miconazole, les quinolones, clarithromycine) ;
- médicaments pour empêcher la coagulation du sang (antivitamines K de type dérivés coumariniques tels que la warfarine) ;
- médicaments favorisant le développement musculaire (anabolisants) ;
- médicaments utilisés pour la thérapie de substitution par hormones sexuelles masculines ;

# ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament et d'autres personnes sont identiques.
- Si l'un des effets indésirables non mentionnés ci-dessous vous paraît suspect, contactez votre pharmacien.

Que contient ce médicament ?

1. Qu'est-ce que ZYLORIC ?

2. Quelles sont les propriétés de ZYLORIC ?

3. Comment prendre ZYLORIC ?

4. Quels sont les effets indésirables possibles ?

5. Comment empêcher les effets indésirables ?

6. Informations pratiques

## ZYLORIC 200 mg

Boîte de 28 comprimés  
A.M.M. N° 62 DMP/21/NTT  
SOTHEMA BOUSKOURA

Réimburseable AMO



6 118000 022244

31,30

prescrit. Ne le donnez pas à une personne sans ordonnance si les signes de leur maladie sont identiques.

Si vous remarquez un effet indésirable, contactez votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

Si quelles cas est-il utilisé ?

avant de prendre ZYLORIC.

## 1. QU'EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC agit en ralentissant l'élimination de l'acide urique dans l'organisme. Il aide à éliminer l'acide urique lorsque votre organisme produit une grande quantité de ce produit.

l'acide urique est une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :**

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre pharmacien ou de votre pharmacien.

**Avertissements et précautions :**

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnies Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre ZYLORIC.

# ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament et d'autres personnes sont identiques.
- Si l'un des effets indésirables non mentionnés ci-dessous vous paraît suspect, contactez votre pharmacien.

Que contient ce médicament ?

1. Qu'est-ce que ZYLORIC ?

2. Quelles sont les propriétés de ZYLORIC ?

3. Comment prendre ZYLORIC ?

4. Quels sont les effets indésirables possibles ?

5. Comment empêcher les effets indésirables ?

6. Informations pratiques

## ZYLORIC 200 mg

Boîte de 28 comprimés  
A.M.M. N° 62 DMP/21/NTT  
SOTHEMA BOUSKOURA

Réimburseable AMO



6 118000 022244

31,30

prescrit. Ne le donnez pas à une personne sans ordonnance si les signes de leur maladie sont identiques.

Si vous remarquez un effet indésirable, contactez votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

Si quelles cas est-il utilisé ?

avant de prendre ZYLORIC.

## 1. QU'EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC agit en ralentissant l'élimination de l'acide urique dans l'organisme. Il aide à éliminer l'acide urique lorsque votre organisme produit une grande quantité de ce produit.

l'acide urique est une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :**

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre pharmacien ou de votre pharmacien.

**Avertissements et précautions :**

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnies Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre ZYLORIC.





## **COVERAM® 5 mg / 5 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

## **COVERAM® 10mg / 5 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

**Veuillez Lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés ci-dessous vous survient, parlez-en à votre pharmacien.

**Dans cette notice :**

1. Qu'est ce que Coveram® ?
  2. Quelles sont les indications ?
  3. Comment prendre Coveram® ?
  4. Quels sont les effets indésirables ?
  5. Comment conserver Coveram® ?
  6. Informations supplémentaires.
- 1. QU'EST-CE QUE COVERAM® ?**
- Classe pharmacothérapeutique : inhibiteurs calciques. Coveram® est indiqué dans le traitement de la maladie de l'artériosclérose et de l'hypertension du cœur en sang est réduite ou bloquée).

Les patients qui prennent déjà séparément des comprimés de péridopril et d'amlopipine peuvent à la place recevoir un comprimé de COVERAM qui contient les deux principes actifs.

COVERAM est une association de deux principes actifs, péridopril et amlopipine. Péridopril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC). Amlopipine est un antagoniste calcique (qui appartient à la classe des dihydropyridines). Ceux-ci agissent en dilatant et en décontractant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux.

- 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE**
- 3. COMMENT PRENDRE COVERAM® ?**
- Prenez Coveram® une fois par jour, au moment de la prise du petit déjeuner ou au moment de la prise du repas. Prenez-le avec un verre d'eau.
- 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?**
- Certains effets indésirables peuvent survenir lorsque vous prenez Coveram®. Si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien.
- 5. COMMENT CONSERVER COVERAM® ?**
- Conservez Coveram® à température ambiante, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.
- 6. INFORMATIONS POUR LE PHARMACIEN**
- Informations supplémentaires pour le pharmacien.

**COVERAM® 5mg/5mg**  
Péridopril arginine / amlodipine

30 comprimés



6 118 001 130078

(IEC)

dans le

## **COVERAM® 5 mg / 10 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

## **COVERAM® 10mg / 10 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

parlez-en à votre médecin ou à

tent et votre médecin pourrait choisir, surtout si votre enfant est un

nines  
uire des véhicules et à utiliser des

pas bien, si vous avez la tête qui tourne,  
si vous présentez des maux de tête, vous  
s ni utiliser de machines et contactez votre

cernant certains composants de COVERAM

monohydrate (un type de sucre). Si votre médecin  
éssent une intolérance à certains sucres, contactez-le

**3. COMMENCER A PRENDRE COVERAM®**

dosage indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez

Avalez votre comprimé avec un verre d'eau, de préférence au même moment de la journée, le matin, avant le repas. Votre médecin décidera de la posologie adaptée pour vous. La dose habituelle est de 1 comprimé par jour.

COVERAM sera généralement prescrit chez les patients prenant déjà séparément des comprimés de péridopril et d'amlopipine.

208,00

## **COVERAM® 5 mg / 5 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

## **COVERAM® 10mg / 5 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

**Veuillez Lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés ci-dessous vous survient, parlez-en à votre pharmacien.

**Dans cette notice :**

1. Qu'est ce que Coveram® ?
  2. Quelles sont les indications ?
  3. Comment prendre Coveram® ?
  4. Quels sont les effets indésirables ?
  5. Comment conserver Coveram® ?
  6. Informations supplémentaires.
- 1. QU'EST-CE QUE COVERAM® ?**
- Classe pharmacothérapeutique : inhibiteurs calciques. Coveram® est indiqué dans le traitement de la maladie de l'artériosclérose et de l'hypertension du cœur en sang est réduite ou bloquée).

Les patients qui prennent déjà séparément des comprimés de péridopril et d'amlopipine peuvent à la place recevoir un comprimé de COVERAM qui contient les deux principes actifs.

COVERAM est une association de deux principes actifs, péridopril et amlopipine. Péridopril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC). Amlopipine est un antagoniste calcique (qui appartient à la classe des dihydropyridines). Ceux-ci agissent en dilatant et en décontractant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux.

- 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE**
- 3. COMMENT PRENDRE COVERAM® ?**
- Prenez Coveram® une fois par jour, au moment de la prise du petit déjeuner ou au moment de la prise du repas. Prenez-le avec un verre d'eau.
- 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?**
- Certains effets indésirables peuvent survenir lorsque vous prenez Coveram®. Si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien.
- 5. COMMENT CONSERVER COVERAM® ?**
- Conservez Coveram® à température ambiante, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.
- 6. INFORMATIONS POUR LE PHARMACIEN**
- Informations supplémentaires pour le pharmacien.

**COVERAM® 5mg/5mg**  
Péridopril arginine / amlodipine

30 comprimés



6 118 001 130078

(IEC)

dans le

## **COVERAM® 5 mg / 10 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

## **COVERAM® 10mg / 10 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

parlez-en à votre médecin ou à

tent et votre médecin pourrait choisir, surtout si votre enfant est un

nines  
uire des véhicules et à utiliser des

pas bien, si vous avez la tête qui tourne,  
si vous présentez des maux de tête, vous  
s ni utiliser de machines et contactez votre

cernant certains composants de COVERAM

monohydrate (un type de sucre). Si votre médecin  
éssent une intolérance à certains sucres, contactez-le

**3. COMMENCER A PRENDRE COVERAM®**

dosage indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez

Avalez votre comprimé avec un verre d'eau, de préférence au même moment de la journée, le matin, avant le repas. Votre médecin décidera de la posologie adaptée pour vous. La dose habituelle est de 1 comprimé par jour.

COVERAM sera généralement prescrit chez les patients prenant déjà séparément des comprimés de péridopril et d'amlopipine.

208,00



ZYLORIC® 100 mg, comprimé  
ZYLORIC® 200 mg, comprimé  
ZYLORIC® 300 mg, comprimé  
ALLOPURINOL



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SON

3. COMMENT PREI

4. QUELS SONT LE

5. COMMENT CON

6. INFORMATIONS

1. QU'EST-CE QUE

INHIBITEUR DE LA

Ce médicament est un

2. QUELLES SON

Si votre médecin vous

N'utilisez jamais Z

- en cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit,
- chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique),
- en cas d'allaitement.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec ZYLORIC, comprimé :

#### Mises en garde spéciales

CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MEDICALE.

Au cours du traitement, avertir immédiatement votre médecin en cas de :

- manifestations cutanées de type démangeaisons, rougeurs, vésicules, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
- fièvre associée à une atteinte de l'état général, éruption cutanée, atteinte du foie ou du rein.

Ces manifestations rares peuvent être graves et imposent le plus souvent l'arrêt immédiat du traitement. En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

#### Précautions d'emploi

Afin d'éviter le déclenchement d'une crise de goutte, ce médicament devra pendant les premiers mois de traitement être associé à de la colchicine. Il ne doit pas être utilisé lors d'une crise aiguë de goutte.

AVANT DE PRENDRE CE MEDICAMENT, PREVENIR VOTRE MEDECIN en cas de :

- défaillance des fonctions du rein,
- de maladie du sang.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS notamment avec la vidarabine (anti-viral), la didanosine, l'azathioprine ou la mercaptopurine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

#### Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

#### Allaitement

En raison du passage de ce médicament dans le lait maternel, l'allaitement est contre-indiqué.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges.

#### Liste des excipients à effet notable : lactose.

#### 3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

#### Posologie

La posologie usuelle varie de 100 à 300 mg par jour. Elle est fonction des résultats du taux sanguin et urinaire en acide urique.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFONDER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

#### Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après le repas.

#### Durée du traitement

DANS TOUS LES CAS, SE CONFONDER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez pris plus de ZYLORIC, comprimé que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement votre médecin.

#### ZYLORIC 200 mg

Boîte de 28 comprimés

A.M.M. N° 52 OMP/21/NTT

SOTHEMA BOURGOGNE

Remboursable AMM



6 118000 022244

#### AUTRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

QUELS ?

#### QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

les troubles liés à l'excès d'acide urique tels que gouttes, calculs,...  
AUTRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?  
tains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.