

**RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR  
ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS**

**Conditions générales :**

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.  
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.  
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.  
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.  
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

**Pharmacie :**

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.  
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

**Biologie et Biologie :**

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.  
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

**Optique :**

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

**Éducation :**

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

**Prothèse :**

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

**Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :**

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

**Adresses Mails utiles**

Réclamation : contact@mupras.com  
Prendre en charge : pec@mupras.com  
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



**Déclaration de Maladie**

N° P19-0049563

Maladie  Dentaire  Optique  Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e) **25198**

Matricule : **3573** Société : **AT**

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : **SEBBATA Abdelhamine**

Date de naissance : **21.01.1952**

Adresse : **25, rue Abou Youssef El Mehdia du**

**Ha. Vilette - Casablanca**

Tél. : **0689984070** Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : **07/02/2020**

Nom et prénom du malade : **SEBBATA ABDELHAMINE** Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : **Thrombose**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.




J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.


Fait à : ..... Le : **07/02/2020**

Signature de l'adhérent(e) : .....

### RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27/10		1		 63, Bd. d'Alger, Angles Rue Washington - Casablanca Tél/Fax: 05 22 23 33 49 / 05 22 23 41 77 Dr. BENCHEOROUN Chadia 05 22 23 41 77

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la facture
 PHARMACIE JAMA... 39, Rue 86, Avenue de l'Indépendance - Casablanca Tél. 05 22 55 65 56	27/10	316,5

### ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

**Important :**

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient																
				Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>															
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>															
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>															
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>															
	<b>O.D.F PROTHESES DENTAIRES</b>		<b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b>		Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>														
			<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
			H																
	25533412	21433552																	
00000000	00000000																		
D	G																		
00000000	00000000																		
35533411	11433553																		
B																			
		<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		DATE DU DEVIS <input type="text"/>															
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

CABINET D'EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES

Dr Chadia BENCHEQROUN

Cardiologue

Ancienne externe des hôpitaux de Paris  
Ancienne interne des hôpitaux de Bordeaux  
Diplômée de la faculté de médecine de Bordeaux  
CES des maladies du cœur et vaisseaux  
Diplômée d'écho-doppler cardiaque et vasculaire  
Membre de la Société Française de Cardiologie  
Filiale Pédiatrique et Filiale d'Echocardiographie

7 SEBASTA Astel heune

7/02/2020

PLAVIC 750G

150

31600

31600

Agly ePehi.



PHARMACIE JANQUIER  
Région de Casablanca  
Docteur en Pharmacie  
39, Rue de l'Anfa - La Vihette  
H.M. Casablanca Tél. 05 22 92 69 56

الدكتورة  
بنشقرتون شادية  
Dr. BENCHEQROUN Chadia  
CARDIOLOGUE  
63 Bd d'Anfa, Angle Rue Washington - Casablanca  
Tél/Fax : 05 22 29 33 49 / 05 22 29 41 71

# Plavix® 75 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel

SANOFI

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre/utiliser ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

**Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce que Plavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Plavix
3. Comment prendre Plavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Plavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

**1. QU'EST-CE QUE PLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ**

Plavix contient du clopidogrel et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette aggrégation, les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé thrombose).

Plavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins (thrombus) dans les vaisseaux sanguins (artères) devenus rigides. Cette maladie également appelée athérombose peut conduire à la survenue d'événements athérombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit Plavix pour empêcher la formation de caillots sanguins et réduire le risque de survenue de tels événements graves car :

- Vous avez des artères qui se sont rigidifiées (aussi connu sous le nom d'athérosclérose), et
- Vous avez déjà eu une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou vous avez une artériopathie des membres inférieurs, ou
- Vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou "d'infarctus du myocarde" (crise cardiaque). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace. Votre médecin doit également vous prescrire de l'acide acétylsalicylique (substance présente dans de nombreux médicaments utilisée pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre, mais aussi pour prévenir la formation de caillots sanguins).
- Vous avez une fréquence cardiaque irrégulière, maladie appelée fibrillation auriculaire, et vous ne pouvez pas être traité par les médicaments appelés « anticoagulants oraux » (antivitamines K) qui empêchent la formation de nouveaux caillots sanguins et la croissance de caillots sanguins déjà présents. Les antivitamines K sont plus efficaces que l'acide acétylsalicylique ou que l'association de Plavix et d'acide acétylsalicylique pour cette maladie. Votre médecin vous a prescrit Plavix et de l'acide acétylsalicylique si vous ne pouvez pas être traité par des anticoagulants oraux et si vous ne présentez pas de risque majeur de saignement.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PLAVIX**

**Contre-indications :**

**Ne prenez jamais Plavix**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au clopidogrel ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6 ;
- Si vous avez une maladie actuellement responsable d'un saignement tel qu'un ulcère de l'estomac ou un saignement dans le cerveau ;
- Si vous souffrez d'insuffisance hépatique sévère.

Si vous pensez être dans l'un de ces cas ou en cas de doute, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

- Vous devez aussi avertir votre médecin immédiatement (appelée purpura thrombopénique thrombotique ou PT) peu, pouvant apparaître comme des petites têtes d'épingle de fatigue extrême inexplicable, confusion, jaunissement (voir rubrique 4 "Effets indésirables éventuels").
- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, l'arrêt du saignement peut être prolongé. Ceci est lié au mode d'action de formation de caillots sanguins. Dans le cas de coupures, exemple au cours du rasage, vous ne devriez généralement pas saigner plus de 10 minutes. Cependant, si ce saignement vous préoccupe, vous devez consulter votre médecin (voir rubrique 4 "Effets indésirables éventuels").
- Votre médecin pourra vous demander de pratiquer des examens de sang.

**Enfants et adolescents**

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents.

**Autres médicaments et Plavix**

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments, même s'il s'agit d'un médicament sans ordonnance. Certains médicaments peuvent exercer une influence sur l'efficacité de Plavix.

Vous devez informer avec précision votre médecin si vous prenez :

- des médicaments qui peuvent augmenter votre risque de saignement :
  - o des anticoagulants oraux (médicaments utilisés pour prévenir la formation de caillots sanguins), un anti-inflammatoire non-stéroïdien, médicament utilisé pour soulager la douleur et/ou les maladies inflammatoires articulaires, de l'héparine ou tout autre médicament utilisé pour empêcher la coagulation du sang,
  - o de la ticlopidine, un autre antiagrégant plaquettaire,
  - o un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine ou la fluvoxamine, médicament utilisé habituellement pour traiter la dépression,
  - o de l'oméprazole ou de l'ésoméprazole pour des maux de tête,
  - o du fluocanazole ou du voriconazole, qui sont des médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques,
  - o de l'efavirenz, un médicament utilisé pour traiter les infections à VIH (immunodéficience humaine).
- de la carbamazépine pour le traitement de certaines formes d'épilepsie,
- du moclobémide, pour le traitement de la dépression,
- du rofécoxib, médicament utilisé pour traiter le diabète,
- du paclitaxel, médicament utilisé pour traiter un cancer.

Si vous avez eu une douleur thoracique grave (angor instable) vous êtes prescrit en association avec de l'acide acétylsalicylique. L'association de ces deux médicaments peut augmenter le risque de saignement. Si vous prenez d'autres médicaments utilisés pour soulager la douleur et l'inflammation, votre médecin doit vous prescrire avec précaution l'association de ces médicaments. L'utilisation occasionnelle d'acide acétylsalicylique (pas plus de 24 heures) ne devrait généralement pas poser de problèmes, mais dans d'autres circonstances doit être discutée avec votre médecin.

**Plavix avec des aliments et boissons**

Plavix peut être pris avec ou sans aliments.

**Grossesse et allaitement.**

Il est préférable de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse. Si vous êtes enceinte ou si vous pensez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin avant de prendre Plavix. Si vous êtes allaitée ou si vous envisagez de le faire, consultez votre médecin avant de prendre Plavix. Si vous prenez Plavix, ne donnez pas de lait à votre bébé. Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement par ce médicament. Si vous allaitez ou prévoyez d'allaiter prochainement, prévenez votre médecin.

Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre Plavix.

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1.  
Ain sebaâ Casablanca

Plavix 75 mg, cp pel b 28  
P.P.V. : 316,00 DH

6 118001 081257

Veillez à conserver ce médicament dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Conservez ce médicament dans son emballage d'origine, à l'abri des enfants. Consultez votre médecin ou pharmacien. Vérifiez toujours la date de péremption et le contenu de l'emballage avant de prendre ce médicament.